

การคัดเลือกวัชพืชเพื่อใช้ในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนฟลูออแรนทีน

Weed Selection for Phytoremediation of Fluoranthene

วราภรณ์ ฉุยฉาย^{1*} และชนิษฐา สมตระกูล²

Waraporn Chouychai^{1*} and Khanitta Somtrakoon²

¹สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

²ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 44150

¹Biology Programe, Faculty of Science and Technology, Nakhonsawan Rajabhat University, Nakhonsawan, Thailand 60000

²Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand 44150

*Corresponding author: waraporn.c@nsru.ac.th

Received: November 2, 2018

Revised: January 15, 2019

Accepted: February 8, 2019

Abstract

Using food crop in phytoremediation increased concern about pollutant biomagnification along food chain. The efficiency of weed to be used in fluoranthene phytoremediation was studied. Three weeds, *Cyperus rotundus*, *Phyllanthus niruri* and *Gomphrena celosioides*, were planted in 200 mg/kg fluoranthene-contaminated soil for 30 days, growth and fluoranthene remaining in soil were compared. The results showed that fluoranthene was not toxic to shoot growth of 3 weeds but decrease root fresh weight and dry weight of *C. rotundus* and *G. celosioides* 58-67 and 61%, respectively, when compared with plant growing in non-contaminated soil. Fluoranthene did not affected to chlorophyll content of *C. rotundus* and *G. celosioides* but decreased chlorophyll B and total chlorophyll of *P. niruri* 34.8 and 20.2%, respectively, when compared with plant growing in non-contaminated soil. However, only *C. rotundus* could decrease fluoranthene content in soil more than non-planted soil after 30 days. The fluoranthene remaining in *C. rotundus*-planted soil was 58.2% while fluoranthene remaining in non-planted soil was 62.6% but they were not different significantly. Fluoranthene was toxic to chlorophyll content of *P. niruri* but was toxic to root fresh weight and dry weight of *C. rotundus* and *G. celosioides*. The selection of weeds which were better tolerant to fluoranthene than these 3 plants should be done in the future.

Keywords: phytoremediation, polycyclic aromatic hydrocarbons, weed

บทคัดย่อ

การใช้พืชอาหารในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยพืชก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการถ่ายทอดเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสารมลพิษ ดังนั้นจึงศึกษาประสิทธิภาพของการใช้พืชเพื่อบำบัดดินที่ปนเปื้อนฟลูออแรนทีน โดยนำวัชพืช 3 ชนิดคือ แห้วหมู ลูกใต้ใบ และบานไม่รู้โรยไปปลูกในดินที่ปนเปื้อนฟลูออแรนทีน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 30 วัน เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณฟลูออแรนทีนที่ยังคงเหลืออยู่ในดิน โดยพบว่าฟลูออแรนทีนไม่เป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของยอดวัชพืชทั้ง 3 ชนิด แต่ส่งผลต่อน้ำหนักของรากแห้วหมูและบานไม่รู้โรยป่า โดยทำให้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของรากพืชทั้งสองชนิดลดลง 58-67 และ 61% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่เจริญเติบโตในดินไม่ปนเปื้อนฟลูออแรนทีน ไม่ส่งผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบแห้วหมูและบานไม่รู้โรยป่า แต่ทำให้คลอโรฟิลล์บีและคลอโรฟิลล์ทั้งหมดของลูกใต้ใบลดลง 34.8 และ 20.2% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่เจริญเติบโตในดินไม่ปนเปื้อน อย่างไรก็ตามมีเพียงแห้วหมูเท่านั้นที่สามารถลดปริมาณฟลูออแรนทีนในดินได้มากกว่าดินที่ไม่ปลูกพืชเมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน โดยมีปริมาณฟลูออแรนทีนที่เหลืออยู่ร้อยละ 58.2 ในขณะที่ดินไม่ปลูกพืชเหลือฟลูออแรนทีนอยู่ร้อยละ 62.6 แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ฟลูออแรนทีนเป็นพิษต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของลูกใต้ใบและมีผลกระทบต่อน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของแห้วหมูและบานไม่รู้โรยป่า จึงควรคัดเลือกวัชพืชทนทานต่อความเป็นพิษของฟลูออแรนทีนได้ดีกว่าพืชทั้งสามชนิดนี้

คำสำคัญ: การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยพืช

โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน วัชพืช

คำนำ

โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือพีเอเอช (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; PAHs) เป็นสารประกอบที่ถูกผลิตขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์ รวมทั้งพบเป็นองค์ประกอบของเชื้อเพลิงถ่านหินปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และน้ำยารักษาสภาพเนื้อไม้ แหล่งที่มาของพีเอเอชที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมมีที่มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย (Nadal *et al.*, 2004) บริเวณถนนที่มีการจราจรคับคั่ง (Oanh *et al.*, 2000) และการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Gadde *et al.*, 2009) โดยพีเอเอชจำนวน 16 ชนิด ได้ถูกกำหนดให้เป็นสารพิษอันตรายที่ต้องรีบกำจัดออกจากสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นสารมลพิษที่มีความคงตัวในสิ่งแวดล้อมสูงสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ง่าย มีฤทธิ์เป็นสารก่อกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็ง (Chouychai, 2011)

การปนเปื้อนพีเอเอชในดินทางการเกษตรสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งมีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว การปนเปื้อนของพีเอเอชในดินจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น เพิ่มระดับความเครียดออกซิเดชันในพืช ทำให้ระดับคลอโรฟิลล์ในใบลดลง รบกวนการทำงานของรากทำให้ความยาวรากสั้นลง ชีวมวลลดลง พีเอเอชยังสามารถสะสมในพืชและมีโอกาสถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารได้ เช่น ในเตียนจินทางภาคเหนือของจีน พบพีเอเอชรวมกัน 16 ชนิด ในดินทางการเกษตรปริมาณ 1.08-6.25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และพบพีเอเอชสะสมในส่วนเหนือดินของพืชที่ปลูกในบริเวณนั้นปริมาณ 0.48-0.98 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยที่กะหล่ำดอกเป็นพืชที่สะสมได้มากที่สุด (Tao *et al.*, 2004) เป็นต้น ปริมาณของฟลูออแรนทีนที่

เป็นพืชต่อพืชนั้นมีรายงานว่า ความเข้มข้นของฟลูออแรนทีนที่ส่งผลกระทบ 20% (EC20) ต่อน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นกล้าหญ้าไรน์ *Trifolium pretense* และ *Sinapsis alba* เท่ากับ 140-650 mg/kg (Sverdrup *et al.*, 2003)

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยฟิเอเอซสามารถทำได้หลายวิธี การใช้พืชเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (Phytoremediation) จัดเป็นวิธีการที่สามารถปรับใช้กับการปนเปื้อนฟิเอเอซในดินที่มีการทำเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการปลูกพืชเพื่อบำบัดสารมลพิษมีต้นทุนในการบำบัดต่ำกว่าการใช้วิธีการทางกายภาพและเคมีไม่ทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างทางกายภาพของดิน รวมทั้งยังลดการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งจะทำให้เกิดการปนเปื้อนซ้ำซ้อนของสารเคมีในดินที่มีการทำเกษตรกรรมอีกด้วย การปลูกพืชสามารถส่งเสริมการย่อยสลายฟิเอเอซในดินได้โดยเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดิน ไรโซสเฟียร์ จุลินทรีย์ และพืช ซึ่งประสิทธิภาพของปฏิสัมพันธ์นี้ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ ระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ (Siciliano and Germida, 1998) พืชที่มีรายงานว่าสามารถกำจัดฟิเอเอซในดินได้ดีและพบได้ในประเทศไทยมักเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นพืชอาหาร เช่น ข้าวโพด (Chouychai *et al.*, 2009) ถั่วพู (Somtrakoon *et al.*, 2014a) ถั่วฝักยาว (Somtrakoon *et al.*, 2012) กระจับปี่ (Somtrakoon *et al.*, 2015) ถั่วอัลฟalfa (Wei and Pan, 2010) บวบเหลี่ยม (Somtrakoon *et al.*, 2014b) และพริกชี้ฟ้า (Liste and Alexander, 2000) หรือพืชเสฟติด เช่น กัญชา (Liste and Prutz, 2006) การใช้พืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชอาหารแม้จะมีข้อดีในด้านที่ดูแลและหาเมล็ดพันธุ์ได้ง่าย มีชีวมวลมาก และเจริญเติบโตได้เร็ว แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลในด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นการเลือกใช้พืชที่พบได้ง่าย เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของประเทศไทย และไม่ได้เป็นพืชอาหารจึงมีความน่าสนใจมากกว่า

ในกลุ่มของพืชที่ไม่ได้ใช้เป็นพืชอาหารในประเทศไทย พบว่าวัชพืชที่กระจายพันธุ์ตามปกติในประเทศไทยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่ง โดยมีรายงานมาก่อนหน้านี้ว่าวัชพืชหลายชนิดซึ่งพบในบริเวณที่เกิดการปนเปื้อนสามารถปรับตัวให้ทนทานและสามารถกำจัดสารมลพิษนั้นๆ ได้ เช่น พืชที่พบในบริเวณที่ปนเปื้อนน้ำมัน ได้แก่ ไมยราบ คอนสวรรค์ และ *Gazania ripens* สามารถส่งเสริมการย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินได้ โดย *G. ripens* เป็นพืชที่ทนทานต่อความเป็นพิษของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนมากที่สุด (Ikeura *et al.*, 2016) แม้ว่าปัญหาของพืชกลุ่มนี้ คือ ปัญหาการขยายพันธุ์และความคงตัวของสายพันธุ์ รวมทั้งมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวัชพืชในพื้นที่ที่นำเข้าไปใช้บำบัดได้ แต่ถ้าหากวัชพืชที่พบโดยทั่วไปในท้องถิ่นสามารถทนทานต่อฟิเอเอซ และมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการย่อยสลายฟิเอเอซย่อมมีประโยชน์ในการใช้บำบัดฟิเอเอซดีกว่าการใช้พืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชอาหารหรือใช้พืชต่างถิ่น

ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีการแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืชหลายชนิด จึงคัดเลือกวัชพืชที่พบได้บ่อยจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ แห้วหมู (*Cyperus rotundus*) ลูกใต้ใบ (*Phyllanthus niruri*) และบานไม่รู้โรยป่า (*Gomphrena celosioides*) มาทดสอบความสามารถในการบำบัดฟลูออแรนทีน ซึ่งจัดเป็นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนน้ำหนักโมเลกุลสูงโดยใช้การทดลองระดับกระถางทดลอง เพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการใช้พืชพื้นปฐดินในประเทศไทยต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมดินที่ปนเปื้อนฟลูออแรนทีน

ดินที่ใช้ในการทดลองเก็บจากสถานีเกษตรเขาแรด คณะเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำดินที่เก็บมาตั้งทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องจนมีน้ำหนักแห้งคงที่

จากนั้นนำดินมาทำให้ปนเปื้อนฟลูออแรนทินโดยละลายฟลูออแรนทิน (Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริกา ความบริสุทธิ์ร้อยละ 98) 200 มก. ในไดคลอโรมีเทนปริมาตร 50 มล. จากนั้นเทลงในดิน 200 กรัม ผสมให้เข้ากับดินอย่างทั่วถึง และใช้ไดคลอโรมีเทนล้างพีเอเอชที่ติดอยู่ที่บีกเกอร์ จำนวน 2 ครั้ง โดยเทสารละลายพีเอเอชที่ได้จากการล้างบีกเกอร์ลงในดินอีกครั้งแล้วผสมให้เข้ากัน จากนั้นตั้งดินไว้ในตู้ดูดควันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ไดคลอโรมีเทนระเหยไป ระหว่างที่ตั้งทิ้งไว้ให้ผสมดินอย่างสม่ำเสมอ ต่อมานำดินที่เตรียมไว้มาผสมกับดินที่ไม่ปนเปื้อนอีก 800 กรัม ผสมให้เข้ากัน บรรจุดินลงในถุงพลาสติกทนร้อนก่อนบรรจุลงในกระถางเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำขณะปลูกพืช

การเตรียมวัชพืช

คัดเลือกต้นแห้วหมู ลูกใต้ใบ และบานไม่รู้โรยป่า ที่มีขนาดความสูงใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยขุดดินบริเวณที่วัชพืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตและขุดขึ้นมาทั้งราก ระวังกิ่งอย่าให้รากเสียหาย แล้วจึงนำวัชพืชแต่ละชนิดมาปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำเป็นเวลา 2 สัปดาห์ คัดเลือกต้นที่แข็งแรงและความสูงไม่แตกต่างกันไปใช้ในการทดลองต่อไป

การวางแผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยย้ายวัชพืชที่คัดเลือกไว้ปลูกลงในกระถางที่บรรจุดินปนเปื้อนฟลูออแรนทินปริมาณ 1 กิโลกรัม ลงในกระถางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว โดยปลูก 1 ต้น ต่อ 1 กระถาง สำหรับศึกษาการเจริญเติบโตของพืชนั้น แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 2 กรรมวิธี คือ ดินที่ไม่ปนเปื้อนฟลูออแรนทินเป็นชุดควบคุม และดินที่ปนเปื้อนฟลูออแรนทิน 200 มก./กก. แต่ละกรรมวิธีมี 5 ซ้ำ สำหรับการวัดปริมาณฟลูออแรนทินที่เหลืออยู่ในดินนั้น แบ่งชุดทดลองออกเป็น 4 กรรมวิธี คือ ไม่ปลูกพืช ปลูกแห้วหมู ลูกใต้ใบ หรือ บานไม่รู้โรยป่า แต่ละกรรมวิธีมี 5 ซ้ำเช่นเดียวกัน รดน้ำทุกวัน วันละ 10 มล. ต่อกระถาง ตลอดระยะเวลา 30 วัน

ของการทดลองเพื่อรักษาความชื้นของดิน และสลับกระถางทดลองทุกสัปดาห์เพื่อลดความแตกต่างจากการได้รับแสงธรรมชาติ เก็บผลการทดลองโดยเก็บดินในวันเริ่มต้นและวันที่ 30 ของการทดลองเพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณเริ่มต้นของฟลูออแรนทิน วิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ความสูง น้ำหนักสด น้ำหนักแห้งของทั้งยอดและราก รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมดในใบของพืชตามวิธีของ Huang *et al.* (2004)

การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณฟลูออแรนทินในดิน

การสกัดฟลูออแรนทินที่เหลือในดินทำตามวิธีของ Somtrakoon *et al.* (2014b) โดยนำตัวอย่างดินแห้ง 1 กรัม บดผสมกับ Na_2SO_4 ที่ปราศจากน้ำในอัตราส่วน 1:1 จากนั้นละลายฟลูออแรนทิน (Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริกา ความบริสุทธิ์ร้อยละ 98) ความเข้มข้น 100 มก./ล. ในไดคลอโรมีเทนและเติมลงในดินตัวอย่างปริมาตร 100 ไมโครลิตร เพื่อใช้เป็น Internal standard แล้วจึงนำตัวอย่างดินมาสกัดด้วยตัวทำละลายไดคลอโรมีเทน (บริษัท Fisher Scientific Loughborough Leicestershire ประเทศอังกฤษ) ด้วยเครื่องชอกท์เลทเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และปรับอุณหภูมิบนเตาให้ตัวทำละลายหมุนเวียนในหลอดบรรจุสารตัวอย่างให้ได้ 6 รอบต่อชั่วโมง ต่อมานำสารละลายที่สกัดได้มาระเหยแห้งด้วยเครื่องกลั่นสารระเหยแบบหมุน (Rotary evaporator)

การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออแรนทินใช้เครื่อง GC-FID (บริษัท Shimadzu รุ่น GC-2014AFSC) สภาวะในการแยกสารใช้คะปิลาริคอลัมน์ชนิด Rtx®-5MS (บริษัท Restek) (30 เมตร x 25 มิลลิเมตร x 0.25 ไมโครเมตร) โดยฉีดสารแบบ Split ใช้อัตราส่วนในการ Split เป็น 13.4 อัตราการไหลของแก๊สฮีเลียม 1.13 มิลลิเมตรต่อนาที อุณหภูมิของคอลัมน์เริ่มต้น 150°C. โดยคงไว้ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิขึ้นด้วยอัตรา 12°C. ต่อนาที จนอุณหภูมิคอลัมน์สูงถึง 280°C. และอุณหภูมิของดีเทกเตอร์เป็น 320°C ปริมาตรในการฉีดสารเท่ากับ 1 ไมโครลิตร

การวิเคราะห์ทางสถิติ

การเจริญเติบโตของยอดและราก และปริมาณคลอโรฟิลล์แสดงด้วยค่าเฉลี่ย $\pm$ ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และใช้ T-test ในการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธีของพืชแต่ละชนิด สำหรับปริมาณฟลูออแรนทีนที่เหลือในดิน ใช้ One-way ANOVA และ LSD's test ในการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี

ผลการวิจัย

พืชทั้งสามชนิดที่ย้ายมาปลูกในดินที่ปนเปื้อนฟลูออแรนทีนสามารถเจริญเติบโตได้จนครบ 30 วัน โดยมีลักษณะภายนอกไม่แตกต่างกับต้นที่เจริญเติบโตในดินไม่ปนเปื้อน มีเพียงใบของลูกไ้ใบที่ปลูกในดินปนเปื้อน

ฟลูออแรนทีนที่มีสีเหลืองกว่าต้นที่เจริญเติบโตในดินที่ไม่ปนเปื้อน (Figure 1) เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยอดและรากระหว่างต้นที่เจริญเติบโตในดินปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนฟลูออแรนทีนพบว่า ความยาวยอด น้ำหนักสดของยอด และน้ำหนักแห้งของยอดของพืชทั้งสามชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P>0.05$) ในขณะที่ฟลูออแรนทีนมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากโดยน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของรากแห้งเหี่ยวและบานไม่รู้โรยป่าที่เจริญเติบโตในดินปนเปื้อนฟลูออแรนทีนน้อยกว่าต้นที่เจริญเติบโตในดินไม่ปนเปื้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ในขณะที่น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของรากลูกไ้ใบและความยาวรากของพืชทั้งสามชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P>0.05$) (Table 1)



Figure 1 Growth of *C. rotundus* (left), *P. niruri* (central) and *G. celosioides* (right) in non-contaminated and 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil for 30 days

Abbreviation: C = non-contaminated soil, F= 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil

Table 1 Growth of 3 weeds in non-contaminated and 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil for 30 days

Plant	Shoot			Root		
	Length (cm)	Fresh weight (g)	Dry weight (g)	Length (cm)	Fresh weight (g)	Dry weight (g)
<i>C. rotundus</i>						
C	7.3±0.2	1.4±0.1	0.34±0.03	17.1±1.3	0.9±0.2a	0.26±0.05a
F	7.5±0.4	1.4±0.2	0.34±0.06	14.0±1.2	0.3±0.0b	0.10±0.02b
<i>P. niruri</i>						
C	24.5±2.7	1.7±0.3	0.50±0.09	8.5±1.1	0.9±0.3	0.23±0.08
F	24.6±2.2	2.7±0.8	0.68±0.21	9.2±0.6	0.8±0.1	0.20±0.04
<i>G. celosioides</i>						
C	30.1±2.0	9.3±1.9	2.71±0.72	12.3±2.3	3.1±0.5a	0.99±0.21a
F	25.1±2.3	5.5±1.4	1.37±0.29	7.7±1.1	1.3±0.3b	0.38±0.08b

*Different lower case letter shown significant difference ($P<0.05$) between non-contaminated and 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil. Abbreviation: C = non-contaminated soil, F= 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil

Table 2 Chlorophyll content of 3 weeds in non-contaminated and 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil for 30 days

Plant	Chlorophyll a (mg/ml)	Chlorophyll b (mg/ml)	Total chlorophyll (mg/ml)
<i>C. rotundus</i>			
C	29.2±0.4	25.8±5.1	55.0±5.2
F	29.5±0.4	15.1±0.6	44.6±0.8
<i>P. niruri</i>			
C	27.8±0.1b	52.5±0.9a	80.3±0.9a
F	29.9±0.3a	34.2±2.6b	64.1±2.3b
<i>G. celosioides</i>			
C	29.6±0.5	35.2±4.1	64.8±3.7
F	30.5±0.2	24.6±3.0	55.1±3.1

*Different lower case letter shown significant difference ($P<0.05$) between non-contaminated and 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil. Abbreviation: C = non-contaminated soil, F= 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil

Table 3 Percentage of fluoranthene remaining in 200 mg/kg fluoranthene contaminated soil planted with each weed for 30 days

Plant	%Remaining of fluoranthene
Non-plant	62.6±13.8
<i>C. rotundus</i>	58.2±8.5
<i>P. niruri</i>	63.6±4.8
<i>G. celosioides</i>	70.4±5.2

เมื่อพิจารณาจากปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของพืชทั้งสามชนิด พบว่าในใบเหี่ยวและใบบานไม่รู้โรยป่ามีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมดในดินที่ปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนไม่แตกต่างกัน ($P>0.05$) ในขณะที่ปริมาณคลอโรฟิลล์เอในใบของลูกใต้ใบที่เจริญเติบโตในดินที่ปนเปื้อนฟลูออแรนทีนมากกว่าต้นที่เจริญเติบโตในดินไม่ปนเปื้อน แต่มีปริมาณคลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมดน้อยกว่าต้นที่เจริญเติบโตในดินที่ไม่ปนเปื้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 2)

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเพิ่มการย่อยสลายทางชีวภาพของฟลูออแรนทีนในดินพบว่า การปลูกพืชและไม่ปลูกพืชไม่มีผลต่อปริมาณฟลูออแรนทีนในดิน โดยมีปริมาณฟลูออแรนทีนที่เหลืออยู่อยู่ระหว่าง 58.2-70.4% ของปริมาณเริ่มต้น ภายในระยะเวลา 30 วัน

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย

เมื่อเปรียบเทียบการย่อยสลายฟลูออแรนทีนในดินชุดที่ปลูกพืชนั้น เฉพาะการปลูกเหี่ยวเท่านั้นที่สามารถเพิ่มการย่อยสลายฟลูออแรนทีนในดินได้ โดยเกิดการย่อยสลายได้ 61.8% ภายในเวลา 30 วัน หรือคิดเป็น 93% ของดินที่ไม่ปลูกพืช ประสิทธิภาพของการปลูกเหี่ยวนี้ขึ้นอยู่กับระดับเดียวกับการปลูก *Lolium perenne*

เป็นเวลา 365 วัน ที่สามารถลดปริมาณฟลูออแรนทีนได้คิดเป็น 98.2% ของดินที่ไม่ปลูกพืช (Rezek *et al.*, 2008) แต่จัดว่ามีประสิทธิภาพน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว กระเจียวเขียว ถั่วฝักยาว และบวบเหลี่ยมที่สามารถลดปริมาณฟลูออแรนทีนได้คิดเป็น 21.6, 23.4, 10.4 และ 4.2% ของดินที่ไม่ปลูกพืชตามลำดับ (Somtrakoon *et al.*, 2014b; 2015) นอกจากนั้นฟลูออแรนทีนยังแสดงความเป็นพิษต่อวัชพืชทั้ง 3 ชนิด โดยลูกใต้ใบนั้นใบแสดงอาการคลอโรซิส (Chlorosis) และปริมาณคลอโรฟิลล์บีในใบลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งมีโอกาสที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงในระยะยาว ส่วนบานไม่รู้โรยป่ากับเหี่ยวนั้นปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบไม่ได้รับผลกระทบจากฟลูออแรนทีนแต่น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของรากลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนของรากเป็นส่วนที่สัมผัสกับสารมลพิษโดยตรงและมีบทบาทสำคัญทั้งในการดูดน้ำและธาตุอาหารจากดิน และหลังสารที่จำเป็นลงสู่ดินด้วย

หากพิจารณาในด้านการลดปริมาณฟลูออแรนทีนในดินแล้ว การปลูกลูกใต้ใบและบานไม่รู้โรยป่าไม่เพิ่มการย่อยสลายฟลูออแรนทีนในดินเลย และมีแนวโน้มการย่อยสลายลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่มีรายงานว่าปลูกแล้วมีแนวโน้มลดการย่อยสลายฟลูออแรนทีนในดิน ได้แก่ การปลูก *Melilotus officinalis* เป็นเวลา 180 วัน (Parrish *et al.*, 2005) แต่ทั้งลูกใต้ใบและบานไม่รู้โรยป่า

ยังมีผลยับยั้งการย่อยสลายฟลูออแรนทีนน้อยกว่าการปลูก *Festuca arundinacea* เป็นเวลา 180 วัน ซึ่งมีการย่อยสลายฟลูออแรนทีน 22.6% จากความเข้มข้นเริ่มต้น 16.78 มก./กก. ในขณะที่ดินไม่ปลูกพืชมีการย่อยสลายเกิดขึ้น 33.5% ที่ระยะเวลาเท่ากัน (Parrish *et al.*, 2005)

อย่างไรก็ตาม ในชุดควบคุมของการทดลองนี้ ซึ่งเป็นชุดที่ไม่ปลูกพืช การย่อยสลายฟลูออแรนทีนค่อนข้างสูงและเกิดขึ้นได้เร็ว โดยย่อยสลายได้ถึง 37.4% ภายในระยะเวลา 30 วัน จากความเข้มข้นเริ่มต้น 200 มก./กก. ซึ่งน้อยกว่างานวิจัยอื่นๆ ที่การย่อยสลายฟลูออแรนทีนในดินที่ไม่ปลูกพืชถึง 68.4% ภายในระยะเวลา 1 ปี จากความเข้มข้นเริ่มต้น 103.5 มก./กก. (Rezek *et al.*, 2008) และ 76% ภายในระยะเวลา 84 วัน จากความเข้มข้นเริ่มต้น 3.3 มก./กก. (Hultgren *et al.*, 2010) แต่มากกว่าการย่อยสลายฟลูออแรนทีนในดินที่ไม่ปลูกพืชของงานวิจัยส่วนหนึ่งที่มีการย่อยสลายเกิดขึ้นได้ 1.6-26.2% ภายในระยะเวลา 30 วัน จากความเข้มข้นเริ่มต้น 100 มก./กก. (Somtrakoon *et al.*, 2014b; 2015) และ 50% ภายในระยะเวลา 1 ปี จากความเข้มข้นเริ่มต้น 103.5 มก./กก. (Rezek *et al.*, 2009) ทำให้การกระตุ้นการย่อยสลายด้วยการปลูกพืชไม่มีความจำเป็นในการส่งเสริมการบำบัดฟลูออแรนทีนในดินชุดนี้มากนัก และเป็นไปได้ที่ทำให้เห็นประสิทธิภาพของพืชที่ทดสอบไม่ชัดเจนพอ

แม้ว่าประสิทธิภาพในการเพิ่มการย่อยสลายทางชีวภาพของฟลูออแรนทีนในดินที่ปลูกวัชพืชทั้งสามชนิดไม่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากการใช้วัชพืชนั้นยังมีข้อดีมากกว่าการใช้พืชอาหารหรือพืชสมุนไพรในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนสารมลพิษ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมกับวัชพืชชนิดอื่นหรือเลือกวัชพืชจากพื้นที่ที่เคยเกิดการปนเปื้อนมาก่อน รวมทั้งศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนพีเอเอชในระยะการทดลองที่ยาวขึ้น หรือปลูกพืชในดินที่มีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายพีเอเอชตามธรรมชาติได้น้อยต่อไป ทั้งนี้เพราะการปลูกพืชสามารถส่งเสริมการ

ย่อยสลายพีเอเอชของจุลินทรีย์ได้ทั้งโดยการกระตุ้นผ่านวิธีเมทาบอลิซึมร่วม หรือการส่งเสริมการเจริญและการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ในดิน เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารอ้างอิง

- Chouychai, W., A. Tongkukiatkul, S. Upatham, H. Lee, P. Pokethitiyook and M. Kruatrachue. 2009. Plant-enhanced phenanthrene and pyrene biodegradation in acidic soil. *J. Environ. Biol.* 30: 139-144.
- Chouychai, W. 2011. Distribution and phytotoxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons. *RMUTP Research J.* 5(1): 140-152. [in Thai]
- Gadde, B., S. Bonnet, C. Menke and S. Garivait. 2009. Air pollutant emissions from rice straw open field burning in India, Thailand, and the Philippines. *Environ. Pollut.* 157: 1554-1558.
- Huang, X.D., Y. El Alawi, D.M. Penrose, B.R. Glick and B.M. Greenberg. 2004. Response of three grass species to creosote during phytoremediation. *Environ. Pollut.* 130: 453-463.

- Hultgren, J., L. Pizzul, M.P. Castillo, and U. Granhall. 2010. Degradation of PAH in a creosote-contaminated soil. A comparison between the effects of willows (*Salix viminalis*), wheat straw and a nonionic surfactant. **Int. J. Phytoremediat.** 12: 54-66.
- Ikeura, H., Y. Kawasaki, E. Kaimi, J. Nishiwaki, K. Noborio and M. Tamaki. 2016. Screening of plants for phytoremediation of oil-contaminated soil. **Int. J. Phytoremediat.** 18: 460-466.
- Liste, H. and M. Alexander. 2000. Plant-promoted pyrene degradation in soil. **Chemosphere** 40: 7-10.
- Liste, H. and I. Prutz. 2006. Plant performance, dioxygenase-expressing rhizosphere bacteria, and biodegradation of weathered hydrocarbons in contaminated soil. **Chemosphere** 62: 1411-1420.
- Nadal, M., M. Schuhmacher and J.L. Domingo. 2004. Levels of PAHs in soil and vegetation samples from Tarragona County, Spain. **Environ. Pollut.** 132: 1-11.
- Oanh, N.T.K., L.B. Reutergardh, Tr. Dung, N. Yu, W.X. Yao and H.X. Co. 2000. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the airborne particulate matter at a location 40 km north of Bangkok, Thailand. **Atmospher. Environ.** 34: 4557-4563.
- Parrish, Z.D., M.K. Banks and A.P. Schwab. 2005. Effect of root death and decay on dissipation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the rhizosphere of yellow sweet clover and tall fescue. **J. Environ. Qual.** 34: 207-216.
- Rezek, J., C. Wiesche, M. Mackova, F. Zadrazil and T. Macek. 2008. The effect of ryegrass (*Lolium perenne*) on decrease of PAH content in long term contaminated soil. **Chemosphere** 70: 1603-1608.
- Rezek, J., C. in der Wiesche, M. Mackova, F. Zadrazil and T. Macek. 2009. Biodegradation of PAHs in long-term contaminated soil cultivated with European white birch (*Betula pendula*) and red mulberry (*Morus rubra*) tree. **Int. J. Phytoremediat.** 11: 65-80.
- Siciliano, S.D. and J.J. Germida. 1998. Mechanisms of Phytoremediation: biochemical and ecological interactions between plants and bacteria. **Environ. Rev.** 6: 65-79.
- Somtrakoon, K., W. Wongsomsri, J. Wannarat and W. Chouychai. 2012. Phytoremediation of anthracene-contaminated soil by yard long bean and sweet corn. **Sci. Technol. Ubonratchthanee University J.** 14(4): 1-12. [in Thai]

Somtrakoon, K., W. Chouychai and H. Lee.

2014a. Comparing anthracene and fluorine degradation in anthracene and fluorene-contaminated soil by single and mixed plant cultivation.

Int. J. Phytoremediat. 16: 415-428.

_____. 2014b. Phytoremediation of anthracene and fluoranthene-contaminated soil by *Luffa acutangula*. **Maejo Inter. J. Sci. Technol.** 8: 221-231.

_____. 2015. Removal of anthracene and fluoranthene by waxy corn, longbean and okra in lead-contaminated soil. **Bull. Environ. Contam. Toxicol.** 95: 407-413.

Sverdrup, L.E., P.H. Krogh, T. Nielsen, C. Kjaer

and J. Stenessen. 2003. Toxicity of eight polycyclic aromatic hydrocarbons to red clover (*Trifolium pretense*) ryegrass (*Lolium perenne*) and mustard (*Sinapsis alba*). **Chemosphere** 53: 993-1003.

Tao, S., Y.H. Cui, F.L. Xu, B.G. Li, J. Cao, W.X. Liu, G. Schmitt, X.J. Wang, W.R. Shen, B.P. Qing and R. Sun. 2004. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in agricultural soil and vegetables from Tianjin. **Sci. total Environ.** 320: 11-24.

Wei, S. and S. Pan. 2010. Phytoremediation for soils contaminated by phenanthrene and pyrene with multiple plant species. **J. Soil Sediments.** 10: 886-894.