

ผลของกรดจิบเบอเรลลิก (GA₃) ต่อคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์

Effects of Gibberellic Acid (GA₃) on Quality and Sugar Change of Lotus Flower (*Nelumbo nucifera* Gaerth. cv. Sattrabutra)

เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์^{1/} และ วชิรญา อิมสabay^{1/}

Petcharat Netlak^{1/} and Wachiraya Imsabai^{1/}

Abstract: After harvest, lotus flower shows premature senescence with a short vase life, petal blackening, fading and wilting. We assumed that lotus flower may be deficient in food accumulation after harvest and it has been reported that gibberellic acid (GA₃) extended the vase life of the lotus flower. Therefore, we studied the effect of GA₃ on petal blackening, vase life and sugar change in lotus flower. The results found that the lotus flower (bud stage) holding in 50 mg/L of GA₃ solutions delayed petal blackening and fading, increased water uptake and delayed of decrease in fresh weight change. GA₃ extended the vase life of lotus flower for 0.8-1.4 days. Furthermore, GA₃ increased the stem elongation near the basal of flower approximately 5.5 cm. Lotus flower holding in GA₃ solutions had the level of glucose and fructose accumulation lower than those holding in distilled water. It is indicated that GA₃ promote lotus flower to use sugar in lotus petal.

Keywords: Petal blackening, sugars, GA₃

^{1/} ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

^{1/} Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, 73140, Thailand

บทคัดย่อ: ดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุชย์เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยดอกบัวหลวงแสดงอาการกลีบดำและสีซีดจางและมีอายุการปักแจกันสั้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากอาหารสะสมภายในดอกไม่เพียงพอหรือไม่สามารถนำไปใช้ได้และมีรายงานว่ากรดจิบเบอเรลลิน (GA_3) ยืดอายุปักแจกันได้ จึงได้ศึกษาผลของ GA_3 ต่ออาการกลีบดำ อายุการปักแจกันและการเปลี่ยนน้ำตาลในบัวหลวงตัดดอก พบว่าการปักแจกันดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุชย์ระยะดอกตูมในสารละลาย gibberellic acid (GA_3) 50 mg/L ชะลออาการกลีบดำและสีซีดจางได้ เพิ่มอัตราการดูดน้ำและชะลอการลดลงของการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด โดย GA_3 สามารถยืดอายุการปักแจกันดอกบัวหลวงได้นานกว่าการปักแจกันในน้ำกลั่น 0.8–1.4 วัน และ GA_3 ทำให้ก้านดอกบริเวณคอดอกยืดยาวขึ้นเฉลี่ย 5.5 เซนติเมตร ส่วนการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลของดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 ตรวจพบปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose สะสมน้อยกว่าการปักแจกันในน้ำกลั่น บ่งชี้ว่า GA_3 ส่งเสริมให้ดอกบัวหลวงใช้น้ำตาลที่สะสมในกลีบดอกได้

คำสำคัญ: อาการกลีบดำ น้ำตาล GA_3

คำนำ

ดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุชย์เป็นไม้ตัดดอกที่ตลาดมีความต้องการสม่ำเสมอและในปริมาณที่มาก หลังการเก็บเกี่ยวปัญหาเรื่องคุณภาพของดอกเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากดอกบัวหลวงเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว โดยแสดงอาการกลีบดำและสีซีดจาง ทำให้มีอายุการปักแจกันสั้น ลดคุณค่าทั้งการซื้อและการขาย รวมทั้งยังเป็นข้อจำกัดในการขยายโอกาสสำหรับการส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ (ช.ณัฐศิริ, 2545) สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากดอกบัวหลวงเมื่อตัดจากต้นแล้วจะถูกตัดจากแหล่งน้ำและอาหารรวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดอกไม้ที่ตัดออกจากต้นแล้วยังมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นเดียวกันกับขณะที่ยังอยู่บนต้นเดิม เช่น การหายใจ การสร้างเอทิลีน การคายน้ำ และการเปลี่ยนสีของกลีบดอก และจะถูกเร่งให้หมดอายุการใช้งานเร็วขึ้น (สายชล, 2531) ซึ่งเอทิลีนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเร่งการเสื่อมสภาพของดอกไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว มีการศึกษาบทบาทของเอทิลีนกับการเสื่อมสภาพของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุชย์พบว่าเอทิลีนมีบทบาทในการเร่งให้ดอกบัวหลวงเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและเมื่อมีการให้สารยับยั้งการทำงานของเอทิลีน (1-methylcyclopropene) ทำให้ดอกบัวหลวงเกิดอาการกลีบดำน้อยและช้ากว่าดอกบัวหลวงที่ไม่รม 1-MCP ในช่วง 2 วันแรก แต่หลังจากนั้นอาการกลีบดำสามารถพัฒนาได้ตามปกติ (Imsabai *et al.*, 2010) จากผลดังกล่าวทำให้

คาดว่าปัจจัยเรื่องการขาดอาหารสะสมภายในดอกหรืออาหารสะสมไม่เพียงพอหรือไม่สามารถนำอาหารสะสมไปใช้ได้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดอกบัวหลวงเสื่อมสภาพ

มีรายงานในดอกแกลดิโอลัสพบว่าฟรุกโตสเป็นน้ำตาลหลักที่ใช้ในการพัฒนาจากดอกตูมเป็นดอกบาน และมีการเคลื่อนย้ายของคาร์โบไฮเดรตจากดอกที่เหี่ยวด้านล่างมายังดอกตูมที่กำลังพัฒนา (Waithaka *et al.*, 2001) การให้น้ำตาลในรูปสารละลายน้ำตาลสามารถยืดอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวายได้ (รัชณี, 2550) แต่ในดอกบัวหลวงการให้น้ำตาลจากภายนอกในรูปสารละลายซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส มีบทบาทในการชะลออาการกลีบดำได้เล็กน้อยและมีอายุการปักแจกันไม่แตกต่างจากการปักแจกันในน้ำกลั่นหรือในบางครั้งกลับทำให้อายุการปักแจกันสั้นลง ซึ่งทั้งนี้ขึ้นกับคุณภาพและฤดูกาลของดอก (เพชรรัตน์, 2554)

นอกจากนี้มีการนำสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มจิบเบอเรลลินหรือกรดจิบเบอเรลลิน (GA_3) มาใช้ โดยสารกลุ่มนี้ไม่มีผลโดยตรงต่ออายุการปักแจกันของดอกไม้ (Nowak and Rudnicki, 1990) แต่ GA_3 สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียคลอโรฟิลล์ในใบของดอกอัลสโตรมีเลีย (*Alstroemeria pelegrina*) (Van Doorn *et al.*, 1992) และอาจช่วยลดอาการกลีบดำได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของเจษฎาพร (2554) ที่พบว่าการปักแจกันดอกบัวหลวงในสารละลาย GA_3 สามารถชะลออาการกลีบดำและสีซีดจางได้และยังส่งเสริมการดูดน้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ GA₃ ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตภายใน โดยพบว่าสามารถกระตุ้นให้เมล็ดงอกได้ โดยไม่มีผลเร่งปฏิกิริยา hydrolysis ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สะสมภายในเมล็ดเป็นน้ำตาล ทำให้มีค่า water potential ในเซลล์ต่ำ จึงทำให้น้ำเคลื่อนที่เข้าสู่ภายในเซลล์เพิ่มขึ้น (Taiz and Zeiger, 1991; Salisbury and Ross, 1992) ดอกไม้จึงสามารถดูดน้ำได้เพิ่มขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดอกบัวหลวงเสื่อมสภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวอาจเกี่ยวข้องกับอาหารสะสมภายในดอกบัวหลวง ซึ่งสารละลาย GA₃ ที่นำมาใช้กับดอกบัวหลวงอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตภายในกลีบดอก ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ GA₃ ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตของดอกบัวหลวงตัดดอก

อุปกรณ์และวิธีการ

ดอกบัวหลวงพันธุ์สตบุษย์ที่ใช้ในการทดลอง นำมาจากสวนบัวที่ผลิตเป็นการค้าใน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกใช้ดอกตูมในระยะที่ 3 (Stage 3) เป็นระยะที่ตัดขายเป็นการค้ามากที่สุด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 6-6.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) เข้าก้าตามวิธีการของชาวสวน บรรจุแบบแห้งแล้วขนส่งโดยรถยนต์ปรับอากาศมายังห้องปฏิบัติการทดลองใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นคัดเลือกดอกที่มีคุณภาพดี มี

ความสม่ำเสมอ ไม่มีตำหนิหรือรอยขีดข่วน แล้วนำมาตัดก้านด้วยมีดคมทำมุมเฉียง 45 องศา ให้มีความยาว 25 เซนติเมตรจากคอดอก แล้วนำดอกบัวหลวงที่คัดเลือกแล้วไปทำการทดลอง โดยปักแจกันในสารละลาย gibberellic acid (GA₃) ความเข้มข้น 50 mg/L เปรียบเทียบกับการปักแจกันในน้ำกลั่น (distilled water) จนกระทั่งหมดอายุการปักแจกัน วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ($P \leq 0.05$) ทำการทดลองทั้งหมด 8 ซ้ำ ๆ ละ 1 ดอก บันทึกผลการทดลองดังนี้

การบันทึกผลการทดลอง

1. อาการกลีบดำ โดยบันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดอาการกลีบดำ (%petal blackening) ตั้งแต่ 0-100 เปอร์เซ็นต์ (โดยสังเกตด้วยตาเปล่า) (ภาพที่ 2)
2. อายุการปักแจกัน (vase life) โดยกำหนดให้ดอกบัวหลวงหมดอายุการปักแจกัน เมื่อกลีบดอกบัวเกิดสีดำนากกว่าหรือเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่กลีบดอกบัวทั้งหมด (ภาพที่ 2)
3. การดูดน้ำ (water uptake)
บันทึกการดูดน้ำในแต่ละวัน โดยวัดปริมาตรน้ำในหลอดทดลองที่ลดลงไปแล้วนำไปคำนวณ การดูดน้ำในแต่ละวันจากผลต่างของปริมาตรน้ำ มีหน่วยเป็น มิลลิลิตร/ดอก/วัน



Figure 1 The commercial stages (S1-S4) of the lotus flower



Figure 2 The percentage of petal blackening in the lotus cut flower

4. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด (fresh weight change)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดได้ดังนี้

$$\% \text{ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก} = \frac{\text{น้ำหนักของดอกบัวในแต่ละวัน} - \text{น้ำหนักของดอกบัวเริ่มต้น}}{\text{น้ำหนักของดอกบัวเริ่มต้น}} \times 100$$

5. ความยาวก้านที่เพิ่มขึ้น (stem length) โดยวัดจากคอดอกถึงปลายก้าน มีหน่วยเป็นเซนติเมตร

6. การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน้ำตาลตัดแปลงวิธีการของ Reyes (1982) และรัชนี (2550) ดังนี้

ซึ่งกลีบดอกบัวหลวงชั้นในที่มีสีขาว 1 กรัม นำชิ้นส่วนมาบดละเอียดในไนโตรเจนเหลวด้วยโกร่งที่แช่เย็นจัดให้ละเอียดสกัดด้วยเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร นำไปต้มในอ่างน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที นำมากรองด้วยผ้ากรองที่มีความหนา 4 ชั้น แล้วนำส่วนใสที่ได้กรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร จากนั้นส่วนใสที่ได้นำไปประเหยจนแห้ง ด้วยเครื่อง freeze dryer แล้วละลายตัวอย่างที่แห้งด้วยน้ำ double deionized water ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และกรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.22 ไมโครเมตร อีกครั้ง แล้วนำตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน้ำตาลด้วยเครื่อง high performance liquid chromatograph (HPLC) ใช้คอลัมน์สำหรับแยกน้ำตาลชนิด Sugar Pak I โดยมีส่วนของ water guard-pak เป็นตัวกรองสารก่อนเข้าสู่คอลัมน์ (column) การฉีดสารตัวอย่างเข้าสู่คอลัมน์ใช้เครื่องฉีดตัวอย่างอัตโนมัติ (autosample) ฉีดตัวอย่างปริมาตร 20 ไมโครลิตร ตรวจวัดสารตัวอย่างโดยใช้เครื่องตรวจวัด (detector) ชนิด reflective index รุ่น RID-10A ซึ่งมีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องและบันทึกผลโดยโปรแกรม Shimadzu Class VP มี calcium ethylenediamine tetraacetate (CaEDTA) 50 มก/ลิตร เป็นเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) อัตราการไหล 0.5 มิลลิลิตรต่อนาที ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส คำนวณหาปริมาณน้ำตาล sucrose glucose fructose โดยเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน ได้แก่ sucrose ความเข้มข้น 0.00-0.01 เปอร์เซ็นต์ D-glucose

ความเข้มข้น 0.00-0.01 เปอร์เซ็นต์ และ D-fructose ความเข้มข้น 0.00-0.01 เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลอง

1. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของบัวหลวงตัดดอกที่ปักแจกันในสารละลาย gibberellic acid (GA_3) ความเข้มข้น 50 mg/L เปรียบเทียบกับการปักแจกันในน้ำกลั่น (ชุดควบคุม) พบว่า ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 สามารถชะลออาการกลีบดำและสีซีดจางได้ โดยดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่นจะเกิดอาการกลีบดำมากกว่าดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 และมีการพัฒนาอาการกลีบดำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 อาการกลีบดำพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ (ภาพที่ 3A) ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดลดลงช้ากว่าการปักแจกันในน้ำกลั่น (ภาพที่ 3B) สอดคล้องกับอัตราการดูดน้ำ ที่พบว่า ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 มีอัตราการดูดน้ำมากกว่าการปักแจกันในน้ำกลั่นตลอดอายุการปักแจกัน (ภาพที่ 3C) และพบว่าก้านดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 เกิดการยืดยาวขึ้น โดยเกิดการยืดยาวที่บริเวณคอดอกทำให้ก้านดอกมีความยาวเพิ่มขึ้นจาก 25 เซนติเมตร เป็น 30.5 เซนติเมตร (วัดความยาวก้านในวันเริ่มต้นและวันที่ดอกเสื่อมสภาพ) (ตารางที่ 1) ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 มีอายุการปักแจกันเฉลี่ย 4.0-5.6 วัน ขณะที่ปักแจกันในน้ำกลั่นมีอายุการปักแจกันเฉลี่ย 3.6-4.8 วัน ขึ้นกับฤดูกาลที่ทำการทดลอง (ตารางที่ 2)

2. การเปลี่ยนแปลงน้ำตาล

ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่นมีปริมาณน้ำตาล sucrose สะสมสูงในวันเริ่มต้นหลังตัดดอกจากต้นและเพิ่มขึ้นในวันที่ 1 หลังจากนั้นปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งดอกบัวหลวงเสื่อมสภาพ สอดคล้องกับปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose ที่สะสมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังตัดดอกจากต้นในวันที่ 0 ถึงวันที่ 2 และ




Figure 3 The percentage of petal blackening (A) fresh weight change (B) and water uptake (C) of lotus flowers held in 50 mg/L of gibberellic acid (GA_3) compared to those held in distilled water (control)

สะสมเพิ่มสูงขึ้นเด่นชัดในวันที่ 3 แล้วลดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งดอกบัวหลวงเสื่อมสภาพ โดยพบการสะสมของ น้ำตาล fructose มากกว่าน้ำตาล glucose (ภาพที่ 4A) ส่วนดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 มีรูปแบบ

การเปลี่ยนน้ำตาล sucrose ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม ขณะที่พบการสะสมของปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose น้อยกว่าดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่น (ภาพที่ 4B)

Table 1 The stem length of lotus flowers held in gibberellic acid (GA_3) compared to those held in distilled water

Treatment	The stem length (cm) ^{1/}
Distilled water (control)	25.0
Gibberellic acid (GA_3) 50 mg/L	30.5
<i>T</i> -test	**

^{1/} Data are means of 8 replicate flowers

Table 2 The vase life of lotus cut flowers held in gibberellic acid (GA_3) compared to those held in distilled water

Repeat Times	Vase life (days) ^{1/}		<i>T</i> -test
	Distilled water	GA_3	
1 st (March, 2010)	3.6	5.0	*
2 nd (May, 2010)	4.8	4.8	ns
3 rd (September, 2010)	3.8	4.0	ns
4 th (November, 2010)	4.2	5.0	*
5 th (December, 2010)	4.3	5.6	*
6 th (March, 2011)	4.0	4.0	ns
7 th (November, 2011)	3.9	5.0	**

^{1/} Data are means of 8 replicate flowers




Figure 4 Sugar contents of lotus flowers held in gibberellic acid (GA_3) compared to those held in distilled water (control)

วิจารณ์

ดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์เป็นบัวหลวงตัดดอกที่มีกลีบชั้นนอกเป็นสีเขียวส่วนกลีบชั้นในมีสีขาว เมื่อดอกเริ่มเสื่อมสภาพจะเกิดเป็นจุดสีดำและลามไปทั่วทั้งกลีบดอกชั้นนอก ส่วนกลีบดอกชั้นในจะเป็นสีน้ำตาลในช่วงวันแรกก่อนเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อเสื่อมสภาพ ซึ่งการปักแจกันดอกบัวหลวงในสารละลาย GA_3 ความเข้มข้น 50 mg/L เปรียบเทียบกับการปักแจกันในน้ำกลั่นพบว่า ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 สามารถชะลออาการกลีบดำและสีซีดจางได้ และดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่นจะเกิดอาการกลีบดำมากกว่าดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 ซึ่งพบอาการกลีบดำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่นและสารละลาย GA_3 (ภาพที่ 3A) การชะลออาการกลีบดำและการซีดจางของดอกบัวหลวงน่าจะมาจาก GA_3 ที่ช่วยชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นไปในการทำงานของเตียวกั้นกับรายงานในดอกอัลสโตรมีเลีย (*Alstroemeria pelegrina*) ที่ GA_3 สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียคลอโรฟิลล์ในใบอัลสโตรมีเลีย ได้ (van Doorn *et al.*, 1992)

ส่วนการดูดน้ำของดอกบัวหลวงพบว่า ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 มีการดูดน้ำลดลงช้ากว่าดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่นตลอดอายุการปักแจกัน (ภาพที่ 3C) รวมทั้งยังพบว่าก้านดอกบัวหลวงเกิดการยืดยาวเพิ่มขึ้นบริเวณคอดอกจาก 25 เซนติเมตร เป็น 30.5 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ซึ่งก้านคอดอกมีการยืดยาวเพิ่มขึ้นหลังการปักแจกันและยืดยาวเพิ่มขึ้นทุกวันจนกระทั่งดอกเสื่อมสภาพ การที่ดอกบัวหลวงมีการดูดน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อปักแจกันในสารละลาย GA_3 อาจเป็นผลมาจาก GA_3 โดยทำให้มีการละลายของน้ำตาล (soluble sugar) เพิ่มขึ้นโดยพบว่า GA_3 สามารถกระตุ้นให้เมล็ดงอกได้ โดยมีผลไปเร่งปฏิกิริยา hydrolysis ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สะสมภายในเป็นน้ำตาลและทำให้ค่า water potential ในเซลล์ต่ำลงจึงทำให้น้ำเข้าสู่ภายในเซลล์เพิ่มขึ้น เซลล์จึงเกิดการยืดตัวเนื่องจากแรงดันเต่ง (turgor pressure) (Taiz and Zeiger, 1991; Salisbury and Ross, 1992) นอกจากนี้การที่ GA_3 ทำให้ก้านดอกยืดยาว

ส่งผลให้เป็นการเพิ่มแหล่งรับ (sink) เมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว เช่น การแตกของใบอ่อนที่กำลังพัฒนาซึ่งเป็น sink ที่แรง ทำให้มีการดึงน้ำเข้าสู่เซลล์ โดย GA_3 มีบทบาทในการส่งเสริมการแบ่งเซลล์ (cell division) และการยืดตัวของเซลล์ (cell elongation) โดยมีผลทำให้เกิดการแบ่งเซลล์ในส่วนของปลายยอดอ่อน (shoot apex) และทำให้ลำต้น (stem) เกิดการยืดตัว (Taiz and Zeiger, 1991; Salisbury and Ross, 1992) จากผลของ GA_3 ดังกล่าวจึงทำให้เนื้อเยื่อเจริญบริเวณก้านคอดอกมีการขยายขนาดของเซลล์และเกิดการยืดยาวขึ้นในขณะที่ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่นไม่พบการยืดยาวของก้านดอก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ sink ในดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 จึงทำให้ดอกบัวหลวงมีการดูดน้ำ (อาหาร) ไปเลี้ยงเซลล์ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่ด้วย เมื่อมีการดูดน้ำได้ดีจึงทำให้ดอกบัวหลวงมีน้ำหนักสดลดลงช้ากว่า (ภาพที่ 3B) และมีอายุการปักแจกันนานกว่าการปักแจกันในน้ำกลั่น จากการทดลองซ้ำทั้ง 7 ครั้งพบว่า ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 มีอายุการปักแจกันนานกว่าการปักแจกันในน้ำกลั่น 4 ครั้ง (ตารางที่ 2) โดยพบว่าดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 ทั้ง 4 ครั้งที่ทำการทดลองซ้ำมีการดูดน้ำมากกว่าการปักแจกันในน้ำกลั่น (อัตราการดูดน้ำที่แสดงในภาพที่ 3C จากการทดลองซ้ำครั้งที่ 1)

ดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่นและสารละลาย GA_3 มีปริมาณน้ำตาล sucrose สูงในวันที่ 0 และ 1 แล้วมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อหมดอายุการปักแจกัน อาจเป็นไปได้ว่า ในวันเริ่มต้นการทดลองดอกบัวหลวงได้รับน้ำตาล sucrose ที่ส่งมาจากต้นบัวหลวงและเพิ่มขึ้นในวันที่ 1 ซึ่งอาจได้มาจากส่วนของก้านดอกบัวหลวง แต่หลังจากนั้นมีปริมาณลดลงเนื่องจากดอกไม่มีการเปลี่ยน sucrose ไปเป็น glucose และ fructose โดยกิจกรรมของเอนไซม์ invertase (Hawker *et al.*, 1976) สอดคล้องกับปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose ที่เพิ่มสูงขึ้น พบว่าดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่นมีปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose สะสมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันที่ 1 และ วันที่ 2 และมีปริมาณน้ำตาลสะสมสูงสุดในวันที่ 3 หลังจากนั้นปริมาณลดลง ในวันที่ 1 และ 2 ที่พบปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose มี

ปริมาณน้อย แสดงว่าดอกบัวหลวงอาจนำน้ำตาลไปใช้ได้ สำหรับการหายใจเพื่อการดำรงชีวิต แต่ในวันที่ 3 มีน้ำตาลสะสมอยู่ปริมาณมาก อาจเนื่องจากดอกบัวหลวงไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้หรือนำไปใช้ได้เพียงบางส่วน จึงทำให้เกิดการสะสมขึ้นซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการปรากฏ การเสื่อมสภาพและเกิดอาการกลีบดำ (ภาพที่ 3A)

งานวิจัยของ Figueroa *et al.* (2005) ที่ศึกษาในดอกกุหลาบพันธุ์ 'Bettina' ที่มีอายุการปักแจกันสั้น พบว่าปริมาณน้ำตาลในกลีบดอกมีปริมาณน้ำตาล reducing sugar (glucose และ fructose) ลดลงหลังการปักแจกัน และพบอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเกิดการเสื่อมสภาพของดอก แสดงว่าดอกไม่มีการนำน้ำตาล reducing sugar ไปใช้เพื่อการหายใจ รวมทั้งพบว่าดอกกุหลาบนำน้ำตาล reducing sugar ไปใช้อย่างรวดเร็วจึงทำให้น้ำตาลที่สะสมภายในดอกกุหลาบไม่เพียงพอ สำหรับการหายใจ จึงทำให้ออกกุหลาบพันธุ์ 'Bettina' เสื่อมสภาพเร็วและมีอายุปักแจกันสั้น ส่วนกรณีของดอกบัวหลวงที่มีอายุการปักแจกันสั้นคาดว่าจะเกิดจากการที่ดอกบัวหลวงนำน้ำตาลที่มีอยู่ภายในดอกไปใช้ไม่ได้ เพราะตรวจพบปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose มีการสะสมเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 หลังการปักแจกัน (ภาพที่ 4A) เมื่อทดลองให้น้ำตาลจากภายนอกพบว่าดอกบัวหลวงมีอายุการปักแจกันไม่แตกต่างจากการไม่ได้รับน้ำตาล (เพชรรัตน์, 2554) ซึ่งยืนยันได้ว่าดอกบัวหลวงหมดอายุการปักแจกันเนื่องจากไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ แต่หลังจากนั้นพบปริมาณน้ำตาลในกลีบดอกลดลงอาจเป็นไปได้ว่ามีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนอื่น ๆ ในกรณีที่พืชเสื่อมสภาพจะมีการส่งน้ำตาลกลับไปที่ต้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าในกรณีนี้อาจมีการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากกลีบดอกกลับไปที่ก้านและจากการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในบริเวณก้านคอดอกบัวหลวงพบปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose สูงขึ้นในวันที่ 3 และ 5 ของการปักแจกัน (ข้อมูลไม่ได้แสดง) สำหรับดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในสารละลาย GA_3 ตรวจพบน้ำตาล fructose และ glucose มีปริมาณสะสมน้อยกว่า (ภาพที่ 4B) แสดงว่ามีการนำน้ำตาลไปใช้ได้ดีกว่าดอกบัวหลวงที่ปักแจกันในน้ำกลั่น และสัมพันธ์กับอาการกลีบดำที่พัฒนาช้ากว่าดอกบัวหลวงที่

ปักแจกันในน้ำกลั่น อาจเป็นสาเหตุให้สามารถยืดอายุการปักแจกันดอกบัวหลวงได้

สรุป

การปักแจกันดอกบัวหลวงในสารละลาย GA_3 ความเข้มข้น 50 mg/L สามารถชะลออาการกลีบดำ เพิ่มอัตราการดูดน้ำ และมีปริมาณน้ำตาล glucose และ fructose สะสมในกลีบดอกน้อยกว่าการปักแจกันในน้ำกลั่น จึงมีส่วนช่วยยืดอายุการปักแจกันของดอกบัวหลวงได้

คำขอบคุณ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการทำวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- ช.ณัฐศิริ สุธสุวรรณ. 2545. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอก. แมสพับลิชชิง. กรุงเทพฯ: ประดิพัทธ์. 194 หน้า.
- เจษฎาพร ทุมเพชร, 2554. ผลของ naphthalene acetic acid และ gibberellic acid ต่อคุณภาพบัวหลวงตัดดอก. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. 31 หน้า.
- เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์. 2554. บทบาทของน้ำตาลต่อคุณภาพดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์. ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. 49 หน้า.

- รัชณี ภัทรวาโย. 2550. ผลของน้ำตาลในสารละลายยีสต์อายุที่มีต่อเมแทบอลิซึมของน้ำตาลและกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอร์เทสในดอกกล้วยไม้สกุลหวาย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 84 หน้า.
- สายชล เกตุษา. 2531. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้. บริษัทสารมวลชน จำกัด, กรุงเทพฯ. 291 หน้า.
- Figuerola I., M. T. Colinas, J. Mejía and F. Ramírez. 2005. Postharvest Physiological Changes in Roses of Different Vase Life. *Ciencia e investigación agraria (Cien. Inv. Agr)*. 32(3): 167-176.
- Hawker, J. S., R. R. Walker and H. P. Ruffner. 1976. Invertase and sucrose synthase in flowers. *Phytochemistry* 15: 1411-1443.
- Imsabai W., S. Ketsa, W.G. Van doorn. 2010. Role of ethylene in the lack of floral opening and in petal blackening of cut lotus (*Nelumbo nucifera*) flowers. *Postharvest Biol. Technol.* 58: 57-56.
- Nowak, J. and R. M. Rudnicki. 1990. Postharvest Handling and Storage of Cut Flower, Florist Greens and Potted Plant. Chapman and Hall, London. 210 p.
- Reyes, F. G. R. 1982. Sugar composition and flavor quality of high sugar (Shrunken) and normal sweet corn. *J. Food Sci.* 47:753-755.
- Salisbury, F. and C. W. Ross. 1992. *Plant Physiology*. Wadsworth Publishing Company, California. 682 p.
- Taiz, L. and E. Zeiger. 1991. *Plant Physiology*. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., California. 559 p.
- Van Doorn, W.G., J. Hibma and J. de Wit. 1992. Effect of exogenous hormones on leaf yellowing in cut flowering branches of *Alstromeria pelegrina* L.. *Plant Growth Regul.* 11: 59-62.
- Waithaka, K., L. L. Dodge and M. S. Reid. 2001. Carbohydrate traffic during opening of gladiolus florets. *J. Hort. Sci. Biotech.* 76: 120-124.