



บทความวิจัย

ความหลากหลายชนิดและการกระจายปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก

เสถียรพงษ์ ขาวหิโต^{1*} ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์² ลดา มัทธูรศ³ ดุญณภัตน์ ขาวหิโต⁴ และ มนตรี พิมพ์ใจ¹

¹สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

²สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

³สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

⁴กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ข้อมูลบทความ

Article history

รับ: 25 พฤษภาคม 2566

แก้ไข: 12 ตุลาคม 2566

ตอบรับการตีพิมพ์: 19 ตุลาคม 2566

ตีพิมพ์ออนไลน์: 30 ตุลาคม 2566

คำสำคัญ

ความหลากหลายชนิด

การแพร่กระจาย

ปลา

แม่น้ำนครนายก

บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากหลายชนิดและการกระจายปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก โดยเก็บตัวอย่างปลาทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมีนาคม (ฤดูแล้ง) และเดือนตุลาคม (ฤดูน้ำหลาก) 2563 กำหนดจุดเก็บตัวอย่างจำนวน 3 จุด ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา และอำเภองครักษ์ โดยใช้ข่ายจำนวน 8 ขนาดช่องตา คือ 1.5, 2, 3, 4, 5.5, 6, 7 และ 9 เซนติเมตร ผลการศึกษาเก็บตัวอย่างปลาได้ทั้งหมด จำนวน 437 ตัว จำแนกได้เป็น 10 อันดับ 18 วงศ์ 27 สกุล 31 ชนิด พบวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุดจำนวน 7 ชนิด (23 %) รองลงมา คือ วงศ์ปลาเลียหิน (Labeonidae) จำนวน 6 ชนิด (19 %) วงศ์ปลาช่อน (Channidae) และวงศ์ปลากุ้ย (Notopteridae) จำนวนวงศ์ละ 2 ชนิด (6 %) วงศ์ปลาหมอไทย (Anabantidae) วงศ์ปลาหมอตา (Helostomatidae) วงศ์ปลากะตัก (Osphronemidae) วงศ์ปลาแปบ (Xenocypridae) วงศ์ปลาซิว (Danionidae) วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้และม้าน้ำ (Syngnathidae) วงศ์ปลากะทิง (Mastacembelidae) วงศ์ปลาบู (Buthidae) วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepidae) วงศ์ปลาแป้นแก้ว (Ambassidae) วงศ์ปลาตุ๊ก (Claridae) วงศ์ปลากะพงขาว (Belontiidae) วงศ์ปลาสร้อย (Pangasiidae) และวงศ์ปลาแขยง (Bagridae) จำนวนวงศ์ละ 1 ชนิด (3 %) อำเภองครักษ์ พบปลามากที่สุดจำนวน 21 ชนิด 186 ตัว รองลงมา คือ อำเภอบ้านนา จำนวน 13 ชนิด 168 ตัว และอำเภอเมือง จำนวน 12 ชนิด 83 ตัว ตามลำดับ การอนุรักษ์จากบัญชีแดงองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) พบปลาที่อยู่ในสถานะเสี่ยงมีชีวิตรอดน้อยที่สุดมีสถานภาพไม่ถูกคุกคาม (Least concern; LC) จำนวน 20 ชนิด ปลาที่อยู่ในสถานะเสี่ยงมีชีวิตรอดน้อยที่สุดไม่มีข้อมูลเพียงพอ (Data deficient; DD) จำนวน 2 ชนิด และปลาที่อยู่ในสถานะเสี่ยงมีชีวิตรอดน้อยที่สุดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) และใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened; NT) จำนวน 1 ชนิด ดัชนีความหลากหลายชนิด (Diversity index; H) ดัชนีความมากมายชนิด (Richness index; R) และดัชนีความเท่าเทียม (Evenness index; E) มีค่าเท่ากับ 0.84 ± 0.41 , 1.85 ± 0.83 และ 0.61 ± 0.15 ตามลำดับ

บทนำ

แม่น้ำนครนายก เป็นแม่น้ำสายย่อยของกลุ่มน้ำบางปะกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยอยู่ระหว่างลองจิจูดที่ $101^{\circ}04'$ ถึง $101^{\circ}20'$ เหนือ และอยู่ระหว่างละติจูดที่ $14^{\circ}20'$ ถึง $14^{\circ}24'$ ตะวันออก มีต้นน้ำจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เขาสูง เขาแก้ว เขาสามยอด และเขาเขียว มีแม่น้ำสายเล็ก ๆ ได้แก่ คลองนางรอง คลองวังตะไคร้ คลองแม่น้ำบางปะกง คลองโบท คลองจุมกหลวง คลองเหมือง คลองสาริกา คลองห้วยทราย และคลองบ้านนา ไหลรวมกัน แม่น้ำนครนายกมีลักษณะพื้นเป็นหิน ดินเหนียว ปนโคลน และเป็นทางคดเคี้ยว ถูกกั้นด้วยเขื่อนขุนด่านปราการชล มีความกว้างของแม่น้ำประมาณ 50-100 เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร มีพื้นที่ 1,111,024 ไร่ มีระยะทาง 130 กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภองครักษ์ ไหลไปบรรจบแม่น้ำบาง

ปะกง ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แม่น้ำนครนายกนับว่ามีความสำคัญต่อประชากรชาวนครนายก เนื่องจากเปรียบเสมือนหลอดเลือดหล่อเลี้ยงประชากรในจังหวัดนครนายก มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Department of Mineral Resources, 2014; ORDPB, 2021) ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมแม่น้ำนครนายกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมเนื่องจากประชากรใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนครนายกเป็นจำนวนมาก เช่น การทำการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว น้ำเสียจากชุมชนบ้านเรือน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำจะถูกปล่อยลงคลองไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีการชะล้างโคลนลงรวมกันสู่แม่น้ำนครนายก ประกอบกับลักษณะภูมิศาสตร์ของลำน้ำที่มีความลาดชันน้อยส่งผลทำให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับมาจึงมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มเพื่อที่จะทำการปิดกั้นน้ำเค็มที่หนุนสูงที่สุดในเดือนมีนาคมของทุกปี

*Corresponding author

E-mail address: satienpong.k@msu.ac.th (S. Khowhit)

Online print: 30 October 2023 Copyright © 2023. This is an open access article, production, and hosting by Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University. <https://doi.org/10.14456/paj.2023.29>

จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำโดยตรง (Wanganon, 2006; Charoenjit et al., 2019; Nakhon Nayok Provincial Agriculture and Cooperatives Office, 2023; Nakhon Nayok Provincial Hall, 2023) จากปัญหาเหล่านี้แม่น้ำนครนายกจึงได้รับผลกระทบโดยตรงส่งผลทำให้คุณภาพน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลง รวมทั้งชนิดและจำนวนของปลาในแม่น้ำนครนายกมีการเปลี่ยนแปลงลดจำนวนลงตามไปด้วย เนื่องจากความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาลดลงทำให้ปลาที่มีที่อยู่อาศัยและการกินอาหารของปลาลดลงตามไปด้วย ส่งผลทำให้ปลาบางชนิดอาจจะมีแนวโน้มสูญพันธุ์ในอนาคต (Pfauserova et al., 2021; Koushlesh et al., 2023) หรือสูญหายไปจากแหล่งน้ำนั้น ๆ ได้ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบย้อนกลับต่อคนในชุมชนและผู้ประกอบอาชีพด้านประมงที่พึ่งพาแม่น้ำนครนายกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายชนิดและการแพร่กระจายปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก จะทำให้ทราบสถานะของความหลากหลายของชนิด ความชุกชุม และการกระจายปลาในแม่น้ำนครนายกในแต่ละอำเภอ เพื่อที่จะใช้เป็นความรู้ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐาน เสนอแนะการกำหนดมาตรการวิธีป้องกันแก้ไข จากการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชากรที่อาศัยบริเวณโดยรอบแม่น้ำนครนายกและการหาแนวทางจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาในแม่น้ำนครนายก ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

การสำรวจชนิดปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก โดยเก็บตัวอย่างชนิดปลาทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมีนาคม (ฤดูแล้ง) และเดือนตุลาคม (ฤดูน้ำหลาก) 2563 กำหนดจุดเก็บตัวอย่างจำนวน 3 จุด 3 อำเภอ เป็นตัวแทนแม่น้ำนครนายก ประกอบด้วย อำเภอเมือง (พิกัดลองติจูดที่ 101°23'5389 ละติจูดที่ 14°20'9606) เป็นจุดที่ได้รับอิทธิพลจากการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว อำเภอบ้านนา (พิกัดลองติจูดที่ 101°05'5286 ละติจูดที่ 14°16'9563) เป็นจุดที่ได้รับอิทธิพลจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และอำเภอองครักษ์ (ลองติจูดที่ 101°08'6085 ละติจูดที่ 14°02'1663) เป็นจุดที่ได้รับอิทธิพลจากการประกอบอาชีพด้านการทำประมงและเลี้ยงสัตว์น้ำ (Figure 1) เก็บตัวอย่างปลาโดยใช้ข่ายจำนวน 8 ขนาดช่องตา คือ 1.5, 2, 3, 4, 5.5, 6, 7 และ 9 เซนติเมตร ความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง 45-200 เมตร จุดละ 1 ชั่วโมง ทำการวางข่ายในช่วงเวลาเย็นของวันข้างแรม 15 ค่ำ ทำการเก็บกู้ข่ายในเวลาเช้าของอีกวันหนึ่ง เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง (Panchan, 2013) หลังจากนั้นทำการถ่ายภาพปลาแต่ละชนิดที่เก็บรวบรวมได้และรักษาสภาพตัวอย่างปลาด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินความเข้มข้น 10 % หลังจากนั้นนำตัวอย่างปลาจำแนกหาชนิดปลาและลักษณะทางอนุกรมวิธานตามคู่มือ (Faculty of Fisheries, 1999; Rainboth, 1996; Kottelat, 2001; Hurtle et al., 2004) โดยจัดระบบทางอนุกรมวิธานของปลาตาม Nelson (1994) ทำการตรวจสอบสถานภาพของปลาที่พบในพื้นที่ตามวิธีของ ONEP (2017) และ IUCN (2023) นำข้อมูลปลาที่ได้นำไปวิเคราะห์ข้อมูลดังมีรายละเอียดต่อไปนี้




Figure 1 The sample point of fish in Nakhon Nayok river, Nakhon Nayok Province.

1) ความชุกชุมหรือความถี่ของการปรากฏชนิดปลา (Frequency of occurrence)

โดยใช้สูตร ดังนี้ (Pettingill, 1967)

$$F (\%) = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พบปลาชนิดนั้นในการสุ่ม/จำนวนครั้งในการสุ่มตัวอย่าง}}{\text{จำนวนครั้งที่พบปลาชนิดนั้นในการสุ่ม/จำนวนครั้งในการสุ่มตัวอย่าง}} \times 100$$

โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับความถี่สัมพันธ์ของปลาคือเป็น 5 ระดับ คือ

90–100 % หมายถึง พบบ่อยมาก

65–89 % หมายถึง พบบ่อย

31–64 % หมายถึง พบไม่บ่อย

10–31 % หมายถึง หายาก

1–9 % หมายถึง หายากมาก

2) วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายชนิด (Diversity index; H) ของปลา

โดยใช้ Shonon-Weiner diversity index มีสูตรดังนี้ $H = -\sum (p_i \log_2 p_i)$ (Ludwig & Reynold, 1988; Clarke et al., 1994)

เมื่อ H = ดัชนีความหลากหลาย

P_i = สัดส่วนของจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ i ต่อจำนวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในตัวอย่าง

3) วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลาย (Richness index; R) ของปลา

โดยใช้ Margalef diversity index มีสูตรดังนี้ $R = (S - 1) / \ln(n)$ (Ludwig & Reynold, 1988; Clarke et al., 1994)

เมื่อ R = ค่าดัชนีความหลากหลาย

S = จำนวนชนิดทั้งหมดที่พบ

n = จำนวนตัวทั้งหมดที่พบ

ln = natural logarithm

4) วิเคราะห์ค่าดัชนีความเท่าเทียม (Evenness index; E) ของปลา

โดยใช้สูตรของ Pielous evenness index มีสูตรดังนี้ $E = H / \ln S$ (Ludwig & Reynold, 1988; Clarke et al., 1994)

เมื่อ E = ดัชนีความเท่าเทียม

H = ดัชนีความหลากหลาย

S = จำนวนชนิดที่พบในสถานีสำรวจ หรือ เดือนสำรวจนั้น ๆ

5) วิเคราะห์ทางสถิติ

ทำการวิเคราะห์สถิติความหลากหลายของชนิดปลาและความชุกชุม ในแต่ละอำเภอโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA test)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย

1) ความหลากหลายชนิดปลา

ผลการสำรวจเก็บตัวอย่างปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก สามารถเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 437 ตัว สามารถจำแนกชนิดได้เป็น 10 อันดับ 18 วงศ์ 27 สกุล 31 ชนิด (Table 1) ความหลากหลายชนิด (H) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.43-1.63 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.84 ± 0.41 ดัชนีความหลากหลาย (R) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.33-3.80 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 ± 0.83 ดัชนีความเท่าเทียม (E) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.34-0.88 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.61 ± 0.15 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาความหลากหลายชนิดปลาในแม่น้ำนครนายก พบว่ามีจำนวน 10 อันดับ 23 วงศ์ 52 สกุล 72 ชนิด ดัชนีความหลากหลายชนิด (H) ดัชนีความหลากหลาย (R) และดัชนีความเท่าเทียม (E) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68, 11.27 และ 0.61 ตามลำดับ (Termvidchakorn et al., 2009) ซึ่งมีค่า $H < 1.0$ บ่งบอกถึงความหลากหลายชนิดปลาน้ำจืดต่ำ ประสิทธิภาพการผลิตปลาของแม่น้ำนครนายกอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่มีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา (Tudorance et al., 1979) ดังนั้นแม่น้ำนครนายกมีค่าดัชนีความหลากหลายชนิด (H) ดัชนีความหลากหลาย (R) และดัชนีความ

เท่าเทียม (E) มีค่าแนวโน้มลดต่ำลง สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปและมีจำนวนมากขึ้น เช่น การเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ซึ่งมีความสอดคล้องกับกิจกรรมการใช้พื้นที่เกิดจากมนุษย์จะถูกปล่อยลงคลองไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกโดยตรงโดยที่น้ำไม่มีการบำบัด (Vijaylaxmi et al., 2010; Lee et al., 2015; Chankaew & Chunta, 2020; Wongroj & Siritwattanarat, 2021) ส่งผลต่อชนิดการแพร่กระจายของปลาและความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา ทำให้ปลามีที่อยู่อาศัยลดลงและการกินอาหารของปลาส่งผลทำให้ปลาบางชนิดอาจจะมีแนวโน้มสูญพันธุ์ในอนาคต (Pfäusserova et al., 2021; Koushlesh et al., 2023) ปลาที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) จำนวน 7 ชนิด (23 %) รองลงมา คือ วงศ์ปลาเลียหิน (Labeonidae) จำนวน 6 ชนิด (19 %) วงศ์ปลาช่อน (Channidae) และวงศ์ปลากราย (Notopteridae) จำนวนวงศ์ละ 2 ชนิด (6 %) วงศ์ปลาหมอไทย (Anabantidae) วงศ์ปลาหมอตา (Helostomatidae) วงศ์ปลากระดี่ (Osphronemidae) วงศ์ปลาแปบ (Xenocypridae) วงศ์ปลาซิว (Danionidae) วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้และม้าน้ำ (Syngnathidae) วงศ์ปลากระทิง (Mastacembelidae) วงศ์ปลาขี้ (Buthidae) วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepididae) วงศ์ปลาแบนแก้ว (Ambassidae) วงศ์ปลาสาวย (Pangasiidae) วงศ์ปลาดุก (Clariidae) วงศ์ปลาแขยง (Bagridae) และวงศ์ปลากระทุงเหว (Belonidae) จำนวนวงศ์ละ 1 ชนิด (3 %) (Figure 2) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาความหลากหลายชนิดปลาในแม่น้ำ (Lothongkham, 2008; Noommeechai, 2014; Nokkiew et al., 2016; Petsut et al., 2017; Innak et al., 2019; Seetapan et al., 2020; Tuncharoen et al., 2020) จะพบว่าปลาวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีจำนวนมากที่สุดและเป็นวงศ์เด่นเช่นเดียวกัน เนื่องจากปลาวงศ์ปลาตะเพียน มีความโดดเด่นมากที่สุด พบ 40 % ของปลาน้ำจืดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับปลาวงศ์ปลาตะเพียนเป็นปลาที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศส่งผลทำให้สามารถพบปลาวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ได้ในแหล่งน้ำจืดทั่วไปมากตามไปด้วย (Nelson, 1994; Alexandre et al., 2010)




Figure 2 Composition of fish families caught by gillnets in Nakhon Nayok river, Nakhon Nayok Province.

Table 1 Continued Species diversity, distribution, conservation status, frequency of occurrence of fish in Nakhon Nayok river, Nakhon Nayok Province

No.	Order/Family/Scientific name	Common name	Conservation		Station study (District)						F (%)
			status		Mueang		Banna		Ongkarak		
			ONEP ¹	IUCN ²	Mar.	Oct.	Mar.	Oct.	Mar.	Oct.	
23	<i>Doryichthys boaja</i> (Bleeker, 1850) Order Synbranchiformes Family Mastacembelidae	Long-snouted pipefish	-	DD		+					16.67
24	<i>Macrognathus taeniagaster</i> (Fowler, 1935) Order Gobiiformes Family Buthidae	Zizzag eel	-	LC				+			16.67
25	<i>Oxyeleotris marmorata</i> (Bleeker, 1852) Order Anabantiformes Family Pristolepididae	Marbled Goby	-	LC	+	+					33.33
26	<i>Pristolepis fasciata</i> (Bleeker, 1851) Order Ovalentaria Family Ambassidae	Malayan leaffish	-	LC		+					16.67
27	<i>Parambassis wolffii</i> (Bleeker, 1850) Order Siluriformes Family Pangasiidae	Duskyfin glassy perchlet	-	LC		+	+		+	+	66.67
28	<i>Pangasius bocourti</i> (Sauvage, 1880) Family Clariidae	Bocourt's catfish	-	LC					+		16.67
29	<i>Clarias macrocephalus</i> (Gunther, 1864) Family Bagridae	Broadhead Catfish	NT	DD	+						16.67
30	<i>Hemibagrus nemurus</i> (Valenciennes, 1839) Order Beloniformes Family Belonidae	Yellow Catfish	-	LC					+		16.67
31	<i>Xenentodon cancila</i> (Hamilton, 1822)	Freshwater garfish	-	LC				+		+	33.33

Remark : ¹Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) (2017).

² The International Union for Conservation of Nature (IUCN) (2023): Vulnerable (VU); Near threatened (NT); Least concern (LC); Data deficient (DD).

+ = There are fish found.

ปลาปากดำ (*Labeo chrysophekadion*) ปลากราย (*Chitala omate*) ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ (*Doryichthys boaja*) ปลาหลดลาย (*Macrognathus taeniagaster*) ปลาหมอช้างเหี้ยย (*Pristolepis fasciata*) ปลาสร้อย (*Pangasius bocourti*) ปลาตุ๊กอูย (*Clarias macrocephalus*) และ ปลาหลดเหลือง (*Hemibagrus nemurus*)

2.2) การประเมินความชุกชุมหรือความถี่ของการปรากฏของปลาแต่ละชนิด แบ่งกลุ่มปลาตามอำเภอในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก (Table 1; Figure 3; Figure 4) มีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1) อำเภอเมือง เก็บตัวอย่างปลาได้จำนวน 83 ตัว จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอ (*Anabas testudineus*) ปลาหมอตาล (*Helostoma temminckii*) ปลากระแห (*Barbonymus schwanenfeldtii*) ปลากระสับซิด (*Hampala macrolepidota*) ปลาปากหนวด (*Hypsibarbus lagleri*) ปลากระมัง (*Puntius proctozysron*) ปลาสร้อยหลอด (*Henicorhynchus caudimaculatus*) ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ (*Doryichthys boaja*) ปลาบุหราย (*Oxyeleotris marmorata*) ปลาหมอช้างเหี้ยย (*Pristolepis fasciata*) ปลาแป้นยักษ์ (*Parambassis wolffii*) และปลาตุ๊กอูย (*Clarias macrocephalus*)

2.2.2) อำเภอบ้านนา เก็บตัวอย่างปลาได้จำนวน 168 ตัว 13 ชนิด ได้แก่ ปลากระต๊อ (*Trichopodus microlepis*) ปลาตะเพียนทอง (*Barbonymus altus*) ปลากระแห (*Barbonymus schwanenfeldtii*)

ปลาไส้ตันตาแดง (*Cyclocheilichthys apogon*) ปลาปากหนวด (*Hypsibarbus lagleri*) ปลากระมัง (*Puntius proctozysron*) ปลาซ่า (*Labiobarbus lineatus*) ปลาสร้อยลูกบัว (*Thynnichthys thynnoides*) ปลาแป้นแก้ว (*Parachanna siamensis*) ปลาชีวกายแถบดำ (*Rasbora paviana*) ปลาหลดลาย (*Macrognathus taeniagaster*) ปลาแป้นยักษ์ (*Parambassis wolffii*) และปลากระทุงเหว (*Xenentodon cancila*)

2.2.3) อำเภอองครักษ์ เก็บตัวอย่างปลาได้จำนวน 186 ตัว จำนวน 22 ชนิด ได้แก่ ปลาช่อน (*Channa striata*) ปลากระสง (*Channa lucius*) ปลากระต๊อ (*Trichopodus microlepis*) ปลาตะเพียนทอง (*Barbonymus altus*) ปลากระแห (*Barbonymus schwanenfeldtii*) ปลาตะโกก (*Cyclocheilichthys enoplos*) ปลาปากหนวด (*Hypsibarbus lagleri*) ปลากระมัง (*Puntius proctozysron*) ปลาแกง (*Cirrhinus molitor*) ปลาสร้อยหลอด (*Henicorhynchus caudimaculatus*) ปลาซ่า (*Labiobarbus lineatus*) ปลาสร้อยขาว (*Henicorhynchus siamensis*) ปลาปากดำ (*Labeo chrysophekadion*) ปลาสร้อยลูกบัว (*Thynnichthys thynnoides*) ปลาแป้นแก้ว (*Parachanna siamensis*) ปลาชีวกายแถบดำ (*Rasbora paviana*) ปลากราย (*Chitala omate*) ปลาสร้อย (*Notopterus notopterus*) ปลาแป้นยักษ์ (*Parambassis wolffii*) ปลาสร้อย (*Pangasius bocourti*) ปลาหลดเหลือง (*Hemibagrus nemurus*) และปลากระทุงเหว

(*Xenentodon cancila*) ซึ่งอำเภอองครักษ์น้ำในแม่น้ำมีคุณภาพน้ำและความแตกต่างทางนิเวศวิทยาทางน้ำประกอบด้วย น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย จึงส่งผลทำให้เกิดความหลากหลายของชนิดปลามากที่สุดตามไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่ใกล้จุดที่แม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีน และแม่น้ำบางปะกง มาบรรจบกัน ส่งผลทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และอาหารปลา เช่น แพลงก์ตอนพืชที่สูง (Nokkiew et al., 2016; Tongnunui et al., 2016; Sawasdee & Thowanna, 2019; Khowhit et al., 2022) จึงส่งผลทำให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่สัตว์น้ำ (Termvidchakorn & Hanpongkittikul, 2008) ส่งผลทำให้มีชนิดปลาและจำนวนปลาที่สูงสุดพบปลามากที่สุดจำนวน 21 ชนิด 186 ตัว มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับอำเภอบ้านนา จำนวน 13 ชนิด 168 ตัว และ อำเภอเมือง จำนวน 12 ชนิด 83 ตัว (Figure 3; Figure 4) ซึ่งมีชนิดและจำนวนของปลาดำเพราะว่าอำเภอเมืองและ

อำเภอบ้านนามีต้นน้ำจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบกับลักษณะของแม่น้ำนครนายกอยู่ที่สูงและมีลำน้ำที่มีความคดเคี้ยว น้ำทะเลไม่สามารถหนุนถึง (Department of Mineral Resources, 2014) และคุณภาพน้ำเป็นน้ำจืดอย่างเดียว (Marine Department, 2020) ประกอบกับอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนามีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารปลาที่ต่ำ เช่น แพลงก์ตอนพืช อาจส่งผลต่อปลาทำให้มีความเหมาะสมต่อชนิด ปริมาณ แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งวางไข่สัตว์น้ำต่ำตามไปด้วย (Nakhon Nayok Provincial Hall, 2005; Khowhit et al., 2022) ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ ความหลากหลายของชนิดปลาในแต่ละอำเภอและความชุกชุมหรือความถี่ของการปรากฏในบริเวณแม่น้ำนครนายกนั้นมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) (Figure 3; Figure 4) เนื่องจากอุปสรรคทางการประมงที่ใช้เก็บตัวอย่าง จำนวนจุดเก็บตัวอย่าง ฤดูกาล ลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ แหล่งอาหาร เช่น แพลงก์ตอนพืช




Figure 3 Species and distribution of fish in Nakhon Nayok River ($p < 0.05$).




Figure 4 Fish individual in Nakhon Nayok River ($p < 0.05$).

3) การประเมินสถานภาพของปลา

ผลจากการศึกษาการประเมินสถานภาพชนิดของปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก แบ่งตามสถานภาพด้านการอนุรักษ์จากบัญชีแดงตามสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) (ONEP, 2017) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน (Data deficient; DD) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอ (*Anabas testudineus*) ปลาปากหนวด

(*Hypsibarbus lagleri*) และกลุ่มสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened; NT) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกอูย (*Clarias macrocephalus*) การแบ่งตามสถานภาพด้านการอนุรักษ์จากบัญชีแดงองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN Red List,) (IUCN, 2023) สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสถานภาพไม่ถูกคุกคาม (Least concern; LC) จำนวน 20 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอ (*Anabas testudineus*) ปลาหมอตาล (*Helostoma*

temminckii) ปลาซ็อน (*Channa striata*) ปลากระสง (*Channa lucius*) ปลาตะเพียนทอง (*Barbonymus altus*) ปลากระแห (*Barbonymus schwanenfeldii*) ปลาไล่ต้นตาแดง (*Cyclocheilichthys apogon*) ปลาตะโกก (*Cyclocheilichthys enoplos*) ปลากระสูบขีด (*Hampala macrolepidota*) ปลาแปบแก้ว (*Parachanna siamensis*) ปลาชีวกวายแถบดำ (*Rasbora paviana*) ปลาสร้อยลูกบัว (*Thynnichthys thynnoides*) ปลาสร้อย (*Notopterus notopterus*) ปลาหลดลาย (*Macrogynathus taeniagaster*) ปลาบุหราย (*Oxyeleotris marmorata*) ปลาหมอช้างเหยียบ (*Pristolepis fasciata*) ปลาแป้นยักษ์ (*Parambassis wolffii*) ปลาสร้อย (*Pangasius bocourti*) ปลา กต เหลือง (*Hemibagrus nemurus*) และ ปลากระทุงเหว (*Xenentodon canila*) กลุ่มสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน (DD) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ จัมพูนจระเข้ยักษ์ (*Doryichthys boaja*) และปลาตุ๊กต (*Clarias macrocephalus*) กลุ่มสถานภาพใกล้สูญคุกคาม (NT) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ปลาแกง (*Cirrhinus molitorella*) กลุ่มสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาปากหนวด

(*Hypsibarbus lagleri*) (Table1; Figure 5; Figure 6) เมื่อเปรียบเทียบกับ การประเมินสถานภาพชนิดของปลาในแม่น้ำนครนายก (Termvidchakorn et al., 2009) พบว่ามีความแตกต่างจากการประเมินสถานภาพด้านการอนุรักษ์จากบัญชีแดงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP, 2017) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) กลุ่มสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน (DD) และกลุ่มสถานภาพใกล้สูญคุกคาม (NT) จำนวน 1 ชนิด ส่วนสถานภาพด้านการอนุรักษ์จากบัญชีแดงองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN, 2023) สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มสถานภาพไม่ถูกคุกคาม (LC) จำนวน 45 ชนิด รองลงมา คือ กลุ่มสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน (DD) จำนวน 4 ชนิด กลุ่มสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) จำนวน 2 ชนิด และ กลุ่มสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN) จำนวน 1 ชนิด ตามลำดับ ซึ่งชนิดของปลาในแม่น้ำนครนายก ถูกคุกคาม และมีจำนวนลดลงอันเนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปและมีจำนวนมากขึ้น




Figure 5 The IUCN Red List of fish in Nakhon Nayok river.



Figure 6 Ray-finned fish (*Hypsibarbus lagleri*) are Vulnerable (VU).

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบปลาทั้งหมด 437 ตัว จำแนกได้เป็น 10 อันดับ 18 วงศ์ 27 สกุล 31 ชนิด วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบมากที่สุดคิดเป็น 23 % กลุ่มปลาที่พบบ่อย จำนวน 3 ชนิด ประกอบด้วย ปลากระแห (*Barbonymus schwanenfeldii*) ปลาปากหนวด (*Hypsibarbus lagleri*) และปลาแป้นยักษ์

(*Parambassis wolffii*) อำเภองครักษ์ พบปลามากที่สุดจำนวน 22 ชนิด 186 ตัว มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับอำเภอบ้านนาและอำเภอมือง การประเมินสถานภาพด้านการอนุรักษ์จากบัญชีแดงองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ พบกลุ่มปลา มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาปากหนวด (*Hypsibarbus lagleri*) ส่วนค่าดัชนีความหลากหลายชนิด

(H) ดัชนีความหลากหลาย (R) และดัชนีความเท่าเทียม (E) มีค่าเท่ากับ 0.84 ± 0.41 , 1.85 ± 0.83 และ 0.61 ± 0.15 ตามลำดับ ซึ่งค่าดัชนีความหลากหลายชนิด มีค่า $H < 1.0$ บ่งบอกถึงความหลากหลายชนิดปลาต่ำ ประสิทธิภาพการผลิตปลาของแม่น้ำนครนายกอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่มีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนและปริมาณผลผลิตปลาในแม่น้ำนครนายกลดน้อยลง ควรดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเพื่อเพิ่มความจุของแม่น้ำ เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย ลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเลี้ยงกุ้ง หรือปลาเบญจพรรณ การทำการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และชุมชนบ้านเรือน เป็นต้น ควรที่จะมีการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำนครนายก การใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย การตั้งกฎ การบังคับใช้กฎหมายการห้ามทำการประมงในช่วงฤดูวางไข่หรือน้ำแดงอย่างจริงจัง รวมถึงการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์ทางด้านประมงเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ให้ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้ รหัสนักวิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเพื่อการทดลอง: นายเสถียรพงษ์ ขาวหิตร รหัส U1084032562

References

- Alexandre, C. V., Esteves, K. E., & de Moura e Mello, M. A. M. (2010). Analysis of fish communities along a rural-urban gradient in a neotropical stream (Piracicaba River Basin, Sao Paulo, Brazil). *Hydrobiologia*, 641, 97–114.
- Chankaew, S., & Chunta, S. (2020). Species diversity of economic fish in sago palm swamp, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. *Khon Kaen Agriculture Journal*, 48(Suppl 1), 153-160. (in Thai)
- Charoenjit, K., Piyapong, C., Phodee, P., Boonkhaw, P., Ciolli, K., & Tattoni, C. (2019). *Development of simulation models for prediction of effect of changing land use on water quality of the river basin system in Eastern Economic Corridor (EEC)*. Chon Buri: Faculty of Geoinformatics, Burapha University. (in Thai)
- Clarke, K. R., Gorley R. N., Somerfield, P., & Warwick, R. M. (1994). *Change in marine community: an approach to statistical analysis and interpretation*. Plymouth, UK: Primer-E Ltd.
- Department of Mineral Resources.(2014). *Zone classification for geological and mineral resource management Nakhon Nayok Province*. Bangkok: Department of Mineral Resources, Ministry of Natural Resources and Environment. (in Thai)
- Faculty of Fisheries. (1999). *Analysis handbook of fish*. Bangkok: Faculty of Fisheries, Kasetsart University. (in Thai)
- Hortle, K. G., Lieng, S., & Valbo-Jorgensen, J. (2004). An introduction to Cambodia's inland fisheries. *Mekong Development Series no 4*. Phnom Penh, Cambodia: Mekong river commission.
- Kottelat, M. (2001). *Fishes of Laos*. Sri Lanka: WHT Publications (Pte) Ltds.
- Koushlesh, S. K., Johnson, C., Sarkar, U. K., Das, A. K., Das, B. K., Lianthumluaia, L., Puthiyottill, M., & Naskar, B. K. (2023). Exploring fish assemblage structure, feeding guild, water quality in a typical river-reservoir interface of tropical multistate large reservoir environment, central India. *Environmental Science and Pollution Research International*, 30(1), 2179-2204. doi: 10.1007/s11356-022-22267-7
- Khowhit, S., Lahpun, N., Mathurasa, L., Khowhit, D., & Pimja, M. (2022). Plankton community structure in Nakhonnayok river, Nakhonnayok Province. *Burapha Science Journal*, 27(2), 939-965. (in Thai)
- Innak, N., Naksing, W., Yosipim, N., Jaipong, P., Yaemkong, S., Ngoc, T. N., & Kotham, P. (2019). Diversity and distribution of economic fishes in Kwai Noi river Phisanulok Province. *Khon Kaen Agriculture Journal*, 47(Suppl 2), 447-454. (in Thai)
- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). (2023). *The IUCN (International union for conservation of nature and natural resources) red list of threatened species*. Accessed May 1, 2023. Retrieved from <https://www.iucnredlist.org/>
- Lee, W. O., Kim, D. H., Kim, D. H., Baek, J. M., Lee, S. W., & Yang, G. C. (2015). Distribution characteristics of freshwater fish in Jeju-do, Korea. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity*, 8(1), 83-94.
- Lothongkham, A. (2008). *Fish diversity in Yao river (a tributary of the upper Nan river basin) Nan Province, Northern Thailand*. (Master's Thesis). Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)
- Ludwig, J. A., & Reynold, J. F. (1988). *Statistical ecology: a primer on methods and computing*. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Marine Department. (2020). *Water quality analysis report of Nakhon Nayok river*. Bangkok: Marine Department, Ministry of Transport. (in Thai)
- Nakhon Nayok Provincial Agriculture and Cooperatives Office. (2023). *Basic information of Nakhon Nayok Province*. Nakhon Nayok: Agriculture Information Group. Nakhon Nayok Provincial Hall. (in Thai)

- Nakhon Nayok Provincial Hall. (2023). *Nakhon Nayok Province development plan (2018-2022)*. Accessed August 1, 2023 . Retrieved from https://ww2.nakhonnayok.go.th/news_devpro
- Nakhon Nayok Provincial Hall. (2005). *Determine the season in which the fish with eggs, spawning fish and type, size of fishing gear for fishery*. Nakhon Nayok: Nakhon Nayok Provincial Hall. (in Thai)
- Nokkiew, C., Dampin, N., & Chankao, K. (2016). Effect of water quality to biodiversity of fish in the Tha Chin river. *Thai Environmental Engineering Journal*, 30(2), 67-80. (in Thai)
- Nelson, J. S. (1994). *Fishes of the world*. (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Noommeechai, S. (2014). *Species diversity of fish in community-based fisheries conservation area in Wa river, Nampang and Sannaongmai Subdistricts, Nan Province*. (Master's Thesis). Bangkok. Chulalongkorn University.
- Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP). (2017). *Thailand red data: vertebrates*. Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment. (in Thai)
- Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB). (2021). *Khundanprakanchon dam*. Accessed May 1, 2023. Retrieved from <http://www.rdpb.go.th/th>
- Panchan, R. (2013). Factors influencing catching efficiency and selectivity of gillnets. *Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University*, 15(1), 34-44. (in Thai)
- Pettingill, O. S. (1967). *A laboratory and field manual of ornithology* (3rd ed.). South Yorkshire, United Kingdom: Burgess Pub. Co.
- Petsut, N., Kulabong, S., & Petsut, J. (2017). Species diversity and distribution of fishes in Pranburi river, Phetchaburi Province and Prachuap Khirikhan Province. *International Journal of Agricultural Technology*, 13(5), 671-682.
- Pfaueroova, N., Slavik, O., Horky, P., Turek, J., & Randak, T. (2021). Spatial distribution of native fish species in tributaries is altered by the dispersal of non-native species from reservoirs. *Science of The Total Environment*, 755(Pt. 2), 143108. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143108
- Rainboth, W. J. (1996). *Fishes of the Cambodian Mekong*. Rome: Food and Agriculture Organisation.
- Sawasdee, B., & Thowanna, C. (2019) *A study of natural food in the stomach contents of freshwater fish in Nong Bor Reservoir, Mahasarakham Province*. Maha Sarakham: Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University. (in Thai)
- Seetapan, K., Kaewtip, J., Supawan, C., Wongwut, A., Saensupa, I., Tanitsorn, J., Uppaphong, S., & Pinmongkholgul, S. (2020). Diversity of fish species in Ngim river, Phayao Province. *Burapha Science Journal*, 25(1), 270-284. (in Thai)
- Termvidchakorn, A., & Hanpongkittikul, A. (2008). *Diversity of fishes in the Bangpakong and Prachin Buri river basin*. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)
- Termvidchakorn, A., Suksri, S., & Sridee, N. (2009). *Diversity of fishes larvae in the Bangpakong and Prachin Buri basin*. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)
- Tongnunui S., Beamish, F. W. H., & Kongchaiya, C. (2016). Fish species, relative abundances and environmental associations in small rivers of the Mae Klong river basin in Thailand. *Agriculture and Natural Resources*, 50(5), 408-415. doi: 10.1016/j.anres.2016.09.001
- Tudorance, C., Green, R. H., & Huebner, J. (1979). Structure, dynamics and production of the benthic fauna in Lake Monitoba. *Hydrobiologia*, 64(1), 59-95.
- Tuncharoen, S., Uppapong, S., & Soontornprasis, K. (2020). Diversity of fishes in Nong Leng Sai wetland, Phayao Province. *Khon Kaen Agriculture Journal*, 48(2), 283-292. (in Thai)
- Vijaylaxmi, C., Rajshekhar, M., & Vijaykumar, K. (2010). Freshwater fishes distribution and diversity status of Mullameri river, a minor tributary of Bheema river of Gulbarga District, Karnataka. *International Journal of Systems Biology*, 2(2), 1-9.
- Wanganon, S. (2006). *Impact of sea water invasion on water quality and aquaculture in Bang Pakong river basin*. (Master's Thesis). Bangkok. Kasetsart University. (in Thai)
- Wongroj, W., & Siri Wattanarat, R. (2021). Species diversity of freshwater fish in the agriculture conservation areas of Eastern Bangkok, Thailand. *Srinakharinwirot Science Journal*, 31(1), 71-85.

Research article

Species diversity and distribution of fish in Nakhon Nayok river, Nakhon Nayok Province

Satienpong Khowhit^{1*} Narongrit Lahpun² Lada Mathurasa³ Doonnaput Khowhit⁴ and Montree Pimjai¹

¹*Department of Natural Resources and Environment Management, Faculty of Environment and Resource Studies, Maharakham University, Kantharawichai, Maha Sarakham, 44150*

²*Department of Cosmetic Science, Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bang Khen, Bangkok, 10220*

³*Department of Environmental Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bang Khen, Bangkok, 10220*

⁴*Group of Community Nursing, Faculty of Nursing, Maharakham University, Kantharawichai, Maha Sarakham, 44150*

ARTICLE INFO**Article history**

Received: 25 May 2023

Revised: 12 October 2023

Accepted: 19 October 2023

Online published: 30 October 2023

Keyword

Species diversity

Distribution

Fish

Nakhon Nayok river

ABSTRACT

This study aimed to investigate the species diversity and distribution of fish in the Nakhon Nayok river, located in Nakhon Nayok Province, Thailand. Fish samples were collected on two occasions, in March (dry season) and October (wet season) 2020, from three sampling stations: Muang District, Banna District, and Ongkarak District. The sampling was conducted using gillnets with eight different mesh sizes: 1.5, 2, 3, 4, 5.5, 6, 7, and 9 centimeters. A total of 437 individual fish were collected and classified into 10 orders, 18 families, 27 genera, and 31 species. The most abundant family was Cyprinidae, comprising 7 species (23 % of the total). Following closely was the family Labeonidae, with six (6) species (19 %). Channidae and Notopteridae were represented by two (2) species each (6 %). Furthermore, additional species from various families were identified, with each family contributing one (1) species (3 % of the total). These species include Anabantidae, Helostomatidae, Osphronemidae, Xenocypridae, Danionidae, Syngnathidae, Mastacembelidae, Buthidae, Pristolepidae, Ambassidae, Clariidae, Pangasiidae, Bagridae, and Belontiidae. In Ongkarak district, in which contains the highest number of fish species, totaling 22 species with a combined count of 186 individuals, Banna District found the number of fish in 13 species, 168 individuals, and Banna District found the number of fish in 12 species, 83 individuals respectively. According to the International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species (IUCN), out of the identified species, 20 were categorized as Least Concern (LC) while two species fell into the category of Data Deficient (DD). Additionally, one species was classified as Vulnerable (VU) and Near Threatened (NT). The calculated indices for fish diversity in the study area yielded that the diversity index was determined to be 0.84 ± 0.41 , the richness index was 1.85 ± 0.83 , and the evenness index was 0.61 ± 0.15 .

*Corresponding author

E-mail address: satienpong.k@msu.ac.th (S. Khowhit)

Online print: 30 October 2023 Copyright © 2023. This is an open access article, production, and hosting by Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University. <https://doi.org/10.14456/paj.2023.29>