



ปริมาณฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดกาวไหมจากไหมป่าอีรี่ (*Samia ricini*) ด้วยเทคนิคการสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Total Phenolic, Flavonoid Contents and Antioxidant Activity of Sericin Extracted from Eri Silk (*Samia ricini*) Using Green Extraction Techniques

สุนทร ชูลักษณ์^{*1} และ สุชาวเล ชูลักษณ์²

Sunthorn Chooluck^{*1} and Suchawalee Chooluck²

¹ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

²ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ Department of Biochemistry, Faculty of Science, Burapha University

² Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University

*Corresponding author; E-mail: sunthornc@buu.ac.th

Received: 18 March 2026 /Revised: 16 April 2026 /Accepted: 17 April 2026

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสกัดและศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไหมป่าอีรี่ (*Samia ricini*) เพื่อนำไปพัฒนาเป็นส่วนผสมของเวชสำอางด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำรังไหมไปสกัดหยาบด้วยการต้มกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตจากการเผาข้าวหลามด้วยฟืนไม้ไผ่ เปรียบเทียบกับการต้มด้วยน้ำกลั่น การต้มด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) ความเข้มข้น 0.2% w/v และสกัดด้วยสารละลายยูเรียเข้มข้น 8 โมลาร์ พบว่าการสกัดกาวไหมด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต จากนั้นนำสารสกัดหยาบไปวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford assay พบว่าการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต เป็นเวลา 30 นาทีให้ปริมาณโปรตีนมากที่สุด (791.89 ± 0.85 mg/g) จากนั้นนำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS assay ผลการทดลองพบว่าวิธีการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต เป็นเวลา 90 นาทีนั้นมีปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกสูงที่สุด (253.10 ± 7.07 mg GAE/gDW) และมีฟลาโวนอยด์ (41.72 ± 0.00 mg QE/gDW) อยู่สูง อีกทั้งยังสามารถกำจัดอนุมูล ABTS ได้ดีที่สุดโดยมีร้อยละการยับยั้ง 90.05 ± 2.82 เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH การสกัดด้วยการต้มด้วยน้ำกลั่นเป็นเวลา 90 นาทีกำจัดอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด (ร้อยละการยับยั้ง 62.07 ± 0.79) ดังนั้น วิธีการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตจากการเผาข้าวหลามจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรังไหมอีรี่ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นส่วนประกอบของเวชสำอางได้ในอนาคตเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของที่ไม่ได้ใช้แล้วแก่เกษตรกรและชุมชน

คำสำคัญ: กาวไหม สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ

Abstract

This study investigates the extraction and characterization of bioactive compounds from the Eri silkworm (*Samia ricini*) for the development of sustainable cosmeceutical ingredients. To minimize the use

of harsh reagents, a green extraction approach was employed using an alkaline solution derived from bamboo firewood ash residues in Khao-Lam processing. This method was evaluated against conventional solvents, including distilled water, 0.2% (w/v) Na_2CO_3 , and 8 M. urea solution. The results demonstrate that the ash-based degumming process achieved efficiency comparable to sodium carbonate. Quantitative analysis via Bradford assay identified that the 30-minute Na_2CO_3 extraction yielded the maximum protein concentration (791.89 ± 0.85 mg/g). However, phytochemical profiling and antioxidant capacity assessments using DPPH and ABTS assays revealed that the 90-minute ash solution extraction produced the highest total phenolic content (253.10 ± 7.07 mg GAE/gDW) and significant flavonoid levels (41.72 ± 0.00 mg QE/gDW). This extract also exhibited the most potent ABTS radical scavenging activity ($90.05 \pm 2.82\%$ inhibition), while the 90-minute distilled water extract showed the highest DPPH radical scavenging ($62.07 \pm 0.79\%$ inhibition). In conclusion, utilizing agricultural waste-derived ash provides an efficacious and eco-friendly alternative for recovering bioactive constituents from Eri silk cocoons. This methodology facilitates the valorization of agricultural by-products and offers a promising pathway for the formulation of high-value, bio-based cosmeceuticals, thereby enhancing the economic sustainability of local sericulture communities.

Keywords: Sericin, Phenolic Compound, Flavonoid, Free Radical, Antioxidant

บทนำ

ไหมเป็นเส้นใยโปรตีนธรรมชาติที่ได้จากสิ่งมีชีวิตพวกอาร์โทรพอด (Arthropod) รวมถึง หนอนไหมหรือแมลงชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างเส้นใยได้ เช่น แมงมุม แมงป่อง เส้นไหมเป็นพอลิเมอร์อินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมีกรดอะมิโนกลุ่มที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic amino acid) และกรดอะมิโนกลุ่มที่ชอบน้ำ (Hydrophilic amino acid) จัดเรียงตัวอยู่ซ้ำ ๆ กัน เป็นองค์ประกอบในสายเบปไทด์ เส้นไหมจะถูกสร้างจากต่อมที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Specialized glands) เรียกว่าต่อมไหม (Silk gland) ใน Glandular epithelial cells ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่รวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่ในการขับสารไหมที่เป็นของเหลวออกมา จากนั้นจะถูกเก็บไว้ภายใน Lumen ของต่อมดังกล่าว¹ ไหมแต่ละชนิดล้วนแตกต่างกันทั้งด้านองค์ประกอบ โครงสร้างและคุณสมบัติต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของไหม หนอนไหมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ไหมบ้าน (Domestic silkworm) หรือไหมกินใบหม่อน (Mulberry silkworm) เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวและไหม

ป่าหรือไหมที่ไม่กินใบหม่อนเป็นอาหาร (Non-mulberry silkworm) เส้นไหมที่มีการศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือเส้นไหมจากไหมบ้าน *Bombyx mori* และจากแมงมุมสายพันธุ์ *Nephila clavipes* และสายพันธุ์ *Araneus diadematus*²⁻⁴

โปรตีนเซรีซิน (Sericin) และ โปรตีนไฟโบรอิน (fibroin) เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของไหม (Silk) โดยมีโปรตีนไฟโบรอิน (Fibroin) ซึ่งเป็นโปรตีนเส้นใยอยู่ร้อยละ 70-80 ของน้ำหนักไหมทั้งหมด และโปรตีนเซรีซินอีกร้อยละ 20-30 โปรตีนเซรีซินมีปริมาณกรดอะมิโนเซอรีน (Serine) เป็นองค์ประกอบอยู่เป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 30-33 จึงเป็นที่มาของชื่อ “เซรีซิน” หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “กาวไหม” เนื่องจากมีลักษณะเหนียวเหมือนกาวเป็นชั้นห่อหุ้มเส้นไหมอยู่ในธรรมชาติจะพบกาวไหมอย่างน้อย 5-6 ชนิด ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 65 kDa ไปจนถึงมากกว่า 400 kDa โปรตีนกาวไหมประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจำนวน 18 ชนิดซึ่งรวมถึงกรดอะมิโนจำเป็น

(Essential amino acids) ด้วย โดยจะพบกรดอะมิโนที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 45.8 และกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์อยู่ร้อยละ 42.3 ส่วนกรดอะมิโนที่ไม่มีซัลเฟอร์อยู่ร้อยละ 12.20 ทำให้โปรตีนกาวไหมสามารถละลายน้ำได้ดี^{5, 6} กาวไหมเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ผลิตโดยหนอนไหมซึ่งล้อมรอบและและยึดเส้นใยไฟโบรอินทั้ง 2 เส้นเข้าด้วยกัน มักพบในของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากต้องลอกกาวไหม (Degumming) ออกเพื่อให้เส้นไหมมีความมันวาวและเรียบเนียน จึงถูกทิ้งให้สูญเปล่าโดยไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ แต่จากการศึกษาพบว่ากาวไหมนั้นมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงการวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้ เนื่องจากกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบในกาวไหมมีหมู่ฟังก์ชันที่มีซัลเฟอร์อยู่มาก อาทิเช่น หมู่ไฮดรอกซิล หมู่คาร์บอกซิล และหมู่อะมิโน ทำให้สามารถรวมตัวกับพอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymer) ชนิดต่าง ๆ ได้ดี และการที่มีสารประกอบฟีนอลิก (Polyphenolic compounds), ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid), รงควัตถุ (Pigments) ต่าง ๆ แทรกอยู่ในชั้นของกาวไหม รวมถึงมีกรดอะมิโน เซอริน กรดแอสพาร์ติก (Aspartic acid) และ ทรีโอนีน (Threonine) อยู่สูงทำให้กาวไหมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility) กับร่างกายของมนุษย์ โดยกาวไหมสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติส่งผลให้มีความปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม เหมาะสมสำหรับนำไปใช้งานทางการแพทย์ เช่น วัสดุปลูกถ่ายชั่วคราวหรือวัสดุเย็บแผล กาวไหมยังมีความปลอดภัยด้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อรา และด้านการอักเสบ ช่วยป้องกันการติดเชื้อและส่งเสริมการสมานแผล นอกจากนี้ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นเส้นใย พิล์ม และวัสดุอื่น ๆ ได้ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปต่าง ๆ เช่น การปั่นเส้นใย การหล่อ และการพิมพ์ 3 มิติ คุณสมบัตินี้ทำให้กาวไหมเป็นวัสดุที่หลากหลายเหมาะสำหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าพันแผล และเครื่องสำอาง รวมถึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้^{2, 7-10}

ในการลอกกาวไหมนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ การต้มแล้วสาวไหมออก การสกัดด้วยสารละลายกรดหรือด่าง การใช้เอนไซม์ย่อยโปรตีนหรือใช้สารเคมี โดยในอุตสาหกรรมสิ่งทอนิยมใช้การสกัดด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตที่สามารถลอกกาวไหมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ¹¹ ซึ่งปริมาณของกาวไหมที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการสกัด และสายพันธุ์ของหนอนไหมที่นำมาสกัด ส่วนใหญ่หากใช้สารเคมีในการสกัดจะกำจัดกาวไหมออกไปได้มากแต่ต้องทำการแยกเอาสารเคมีที่ใช้ในการสกัดกาวไหมออกก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้งานต่อไปได้ การแยกสารเคมีออกป็นนั้นซับซ้อนที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการที่จะได้สารสกัดที่ไม่สูญเสียหน้าที่ทางชีวภาพและยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านอุตสาหกรรมจึงมักทิ้งกาวไหมแม้ว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย^{12, 13}

กาวไหมจัดเป็นเป็นสารชีวโมเลกุลจำพวกโปรตีน จึงมีสมบัติเหมือนโปรตีนทั่วไปในร่างกายที่สามารถถูกย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์ในกลุ่มที่ย่อยโปรตีน (Proteolytic enzyme) ผ่านกระบวนการทางชีวภาพ (Biodegradable) จึงไม่ก่อให้เกิดการแพ้ นอกจากนี้กาวไหมยังมีความสมบัติคล้ายเจลเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว และกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดี ทำให้ในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในด้านทางการแพทย์และเวชสำอาง เช่น ลดการอักเสบ ด้านเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด รวมถึงมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งในลำไส้ใหญ่^{3, 14} นำไปผลิตเป็นแผ่นฟิล์มปิดแผลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนให้แผลหายเร็วขึ้น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ^{2, 15} ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ยับยั้งกิจกรรมของปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด (Lipid peroxidation) และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Anti-tyrosinase activity) ที่ทำให้เกิดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งทำให้ผิวหมองคล้ำ^{1, 3, 16} นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของกาวไหมน่าจะมาจากสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ปริมาณของกรดอะมิโนเซอรินและทรีโอนีนที่สูงซึ่งกรดอะมิโนทั้งสองชนิดนี้มีหมู่ไฮดรอกซิลซึ่งทำหน้าที่จับ (Chelation) กับแร่ธาตุต่าง ๆ

เช่น ทองแดงและเหล็ก แร่ธาตุเหล่านี้สามารถเร่งปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการสร้างอนุมูลอิสระขึ้นภายในเซลล์ แต่กาวยาใหม่สามารถช่วยในการยับยั้งกระบวนการนี้ได้ อีกทั้งปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและ ฟลาโวนอยด์ที่พบในชั้นของกาวยาใหม่ก็มีส่วนสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน ทำให้กาวยาใหม่มีคุณสมบัติเด่นในการต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีที่หลากหลายและเป็นสารที่ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารและเวชสำอาง¹ ในปัจจุบันมีการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกาวยาใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมักใช้สารเคมีในการลอกกาวยาใหม่เนื่องจากการใช้สารเคมีนั้นทำให้ได้สารสกัดเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้ว่ากาวยาใหม่มีประโยชน์มากมายทั้งด้านการแพทย์และเวชสำอาง ซึ่งโดยทั่วไป การสกัดกาวยาใหม่จากรังไหมมักอาศัยกระบวนการทางเคมีที่รุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการสกัดอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบเชิงนิเวศ โดยหนึ่งในแนวทางที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial waste) ในการย่อยสลายกาวยาใหม่ ซึ่งวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green extraction) นี้ สามารถแยกกาวยาใหม่ออกได้โดยไม่ทำลายโครงสร้างของไฟโบรอิน จึงถือเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสูงกว่าวิธีการสกัดด้วยสารเคมีแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การพัฒนาวิธีการลอกกาวยาใหม่โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมีในสภาวะที่รุนแรงจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและชุมชน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลอกกาวยาใหม่ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่นมีการใช้สารสกัดจากใบหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 เป็นตัวทำละลาย

ทางเลือกแทนการใช้สารเคมีในการสกัดกาวยาใหม่จากรังไหมไทยพื้นเมืองพันธุ์นางสาว โดยวิธีนี้สามารถลอกกาวยาใหม่ได้โดยไม่ทำลายความแข็งแรงของเส้นใยไหม เมื่อเทียบกับการใช้สารละลาย Na_2CO_3 แบบดั้งเดิมที่ทำให้โครงสร้างของไฟโบรอินเสียหาย¹⁷ นอกจากนี้ยังมีการใช้ต่างจากชี้เถาธรรมชาติโดยมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลอกกาวยาใหม่โดยใช้น้ำต่างจากชี้เถาเปลือกนุ่น ชี้เถาลูกนุ่น และน้ำหมักใบกล้วย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและเกษตรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ต่างสังเคราะห์ พบว่าสามารถนำมาใช้สกัดกาวยาใหม่จากไหมบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ^{18, 19} อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาวิธีการลอกกาวยาใหม่จากไหมป่าโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากการลอกกาวยาใหม่ป่าสายพันธุ์ไหมอีรี่ (*Samia ricini*) โดยการนำชี้เถาจากการเผาข้าวหลามด้วยฟืนไม้ไผ่ มาใช้เตรียมสารละลายต่าง (Alkali solution) หรือ น้ำต่างชี้เถา (Ash solution) เพื่อลอกกาวยาใหม่ โดยใช้ชี้เถาที่เหลือจากการเผาข้าวหลามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง จากร้านค้าในพื้นที่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งชี้เถาไม้ไผ่จะให้สารละลายประเภทโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K_2CO_3) ซึ่งมีความเป็นด่างที่พอเหมาะ ทำให้ลอกกาวยาใหม่ออกได้และช่วยให้เส้นไหมไม่เปื่อยยุ่ยง่าย น้ำทิ้งจากการลอกกาวยาใหม่สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้หรือปล่อยลงแหล่งน้ำได้โดยไม่สร้างมลพิษ เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณของเสียที่มีอยู่มากมายในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีสำเร็จรูป ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถนำวิธีการลอกกาวยาใหม่ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้สู่ชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาเป็นส่วนผสมในเวชสำอางต่อไป

วิธีการวิจัย

1. รังไหมและการเตรียมสารสกัดหยาบกาไหม

1.1. ตัวอย่างรังไหม

รังไหมอีรี่ ทำการซื้อมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมในพื้นที่ อำเภอยะผา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณ 1 กิโลกรัม เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ก่อนทำการสกัด



Figure 1. Cocoons of the Eri silkworm (*Samia ricini*)

1.2. การเตรียมสารสกัดหยาบกาไหม

1.2.1. การต้มด้วยน้ำกลั่น (pH = 6.7)

ทำการเตรียมสารสกัดกาไหมด้วยการต้มด้วยน้ำกลั่น โดยนำรังไหมมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 0.2 ตารางเซนติเมตรและนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นชั่งไหม 0.5 กรัม ต้มในน้ำกลั่น (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 30 มิลลิลิตรเป็นเวลา 30, 60 และ 90 นาที จากนั้นทำการกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1

แล้วแยกเอาเส้นใยไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาชั่งแล้วคำนวณหาร้อยละของการลอกกาไหม (%Degumming) ส่วนสารละลายทำการวัดปริมาตรแล้วเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส²⁰ การคำนวณร้อยละของการลอกกาไหมทำได้โดยการเปรียบเทียบน้ำหนักของไหมก่อนการลอกกาไหมและน้ำหนักของไหมที่ผ่านการลอกกาไหมแล้วดังสมการ

$$\% \text{Degumming} = \frac{(\text{น้ำหนักไหมก่อนสกัด(g)} - \text{น้ำหนักไหมหลังสกัด(g)})}{\text{น้ำหนักไหมก่อนสกัด(g)}} \times 100$$

1.2.2. การต้มด้วยสารละลาย Na_2CO_3 (pH = 11.2)

การเตรียมสารสกัดกาไหมด้วยการต้มด้วยสารละลาย 0.2% (w/v) Na_2CO_3 โดยนำรังไหมมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 0.2 ตารางเซนติเมตรและนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

หลังจากนั้นชั่งไหม 0.5 กรัม ต้มใน 0.2% Na_2CO_3 (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 30 มิลลิลิตรเป็นเวลา 30, 60 และ 90 นาที จากนั้นทำการกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 แล้วแยกเอาเส้นใยไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาชั่งคำนวณหา % Degumming ภายหลังการสกัดด้วย

สารละลายต่าง สารสกัดหยาบที่ได้จะถูกรับค่า pH ให้เป็นกลางที่ 7.0 ทันทีด้วย 1M HCl ขั้นตอนนี้ทำขึ้นเพื่อยืนยันว่าค่า pH จะไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการวิเคราะห์หรือการทดสอบทางชีวภาพในลำดับถัดไป จากนั้นทำการวัดปริมาตรสารละลายแล้วเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส²¹

1.2.3. การต้มด้วยน้ำซี้เถ้า (pH = 10.2)

การเตรียมสารสกัดตัวอย่างด้วยการต้มด้วยสารละลายซี้เถ้าที่ได้มาจากการเผาข้าวหลามด้วยฟืนไม้ไผ่ โดยละลายซี้เถ้า 5 กรัมในน้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วทิ้งให้ตกตะกอนอย่างน้อย 48 ชั่วโมง จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 แล้วนำสารละลายซี้เถ้ามาปริมาตร 30 มิลลิลิตร ซึ่งรังไหมที่นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 0.2 ตารางเซนติเมตร นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น้ำหนัก 0.5 กรัม ต้มในสารละลายซี้เถ้าปริมาตร 30 มิลลิลิตร (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 30, 60 และ 90 นาที จากนั้นทำการกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 แยกเอาเส้นใยไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาชั่งแล้วคำนวณหา % Degumming ทำการปรับค่า pH ของสารสกัดให้เป็นกลางและวัดปริมาตรแล้วเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

1.2.4. การสกัดด้วยสารละลายยูเรีย (pH = 7.6)

ทำการเตรียมสารสกัดตัวอย่างด้วยยูเรีย โดยนำรังไหมมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 0.2 ตารางเซนติเมตร และนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นชั่งไหม 6 กรัม ใส่ในสารละลายยูเรียความเข้มข้น 8 โมลาร์ ปริมาตร 150 มิลลิลิตรเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำไปรีฟลักซ์ (Reflux) ที่ 85 องศาเซลเซียส 30 นาที จากนั้นกรองสารละลายโดยใช้กรวยบุชเนอร์ (Buchner funnel) ด้วยการกรองสุญญากาศ (Vacuum filtration) แบ่งสารละลายที่ได้ 50 มิลลิลิตรไปทำไดอะไลซิส เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นวัดปริมาตรแล้วใส่หลอดเซนตริฟิวส์ขนาด 50 มิลลิลิตรแล้วเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส¹²

2. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford assay

ทำการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในสารสกัดด้วยวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีของ Bradford (1976) โดยนำสารละลายตัวอย่างปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับ Protein assay reagent (Bio-rad) ที่ทำการเจือจางแล้ว 5 เท่า ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นตั้งทิ้งไว้ 5 นาทีและนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร โดยใช้ Bovine serum albumin (BSA) ที่ความเข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นสารละลายมาตรฐาน และใช้สารละลายมาตรฐาน BSA ที่ความเข้มข้น 0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นหลอดเปรียบเทียบ (blank) วิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนโดยคำนวณจากกราฟมาตรฐานของสารละลาย BSA เป็นปริมาณโปรตีนหน่วยไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร²² คำนวณหาปริมาณโปรตีนทั้งหมดในสารสกัดหยาบโดยเทียบกับน้ำหนักแห้งของรังไหม 1 กรัม หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ำหนักแห้งของรังไหม จากสูตร

$$C = cV/g$$

เมื่อ

C = ปริมาณโปรตีนทั้งหมด (ต่อน้ำหนักแห้งรังไหม 1 กรัม)

c = ความเข้มข้นของโปรตีนที่คำนวณได้จากกราฟมาตรฐาน ($\mu\text{g/ml}$)

V = ปริมาตรรวมของสารสกัดกาวไหม (ml)

g = น้ำหนักของรังไหมที่นำมาสกัด (gram)

3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

วิธีการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดหยาบโดยใช้ Folin-Ciocalteu's reagent ที่ดัดแปลงจากวิธีของ Singleton และคณะ (1999) โดยใส่สารละลายตัวอย่างปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับน้ำกลั่นปริมาณ 1,580 ไมโครลิตร จากนั้นเติม Folin-Ciocalteu's reagent ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที แล้วเติม 20% โซเดียมคาร์บอเนต ปริมาตร 300 ไมโครลิตร บ่มในที่มืดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร โดยเติมน้ำ

กลั่นแทนสารละลายตัวอย่างเพื่อใช้เป็นหลอดเปรียบเทียบ (Blank) และใช้กรดแกลลิก (Gallic acid) ที่ความเข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200, และ 400 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นสารละลายมาตรฐาน และหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดแสดงในหน่วย มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก (Gallic acid equivalent; GAE) ต่อน้ำหนักของรังไหมแห้ง 1 กรัม¹⁸

4. การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม

ทำการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวมโดยใช้วิธี aluminum chloride colorimetric method ที่ดัดแปลงจาก Chandra และคณะ (2014) โดยนำสารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 600 ไมโครลิตร ผสมสารละลายอะลูมิเนียมไตรคลอไรด์ ($AlCl_3$) ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร 600 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปบ่มในที่มืดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร โดยเติมน้ำกลั่นแทนสารละลายตัวอย่างเพื่อใช้เป็นหลอดเปรียบเทียบ (blank) และใช้เคอควิเซติน (Quercetin) ที่ความเข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200, และ 400 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นสารมาตรฐาน คำนวณหาปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดหยาบแสดงในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเคอควิเซติน (Quercetin equivalent; QE) ต่อน้ำหนักของรังไหมแห้ง 1 กรัม¹⁸

5. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบกาไหม

5.1. วิธี DPPH radical scavenging assay

ทำการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบกาไหมด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ที่ดัดแปลงจาก Shen และคณะ (2010) โดยตรวจสอบค่าการดูดกลืนแสงที่ลดลงของสารละลาย DPPH ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระที่เสถียรมีสีม่วงเข้ม สามารถดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่นที่ 517 นาโนเมตร เมื่อทำปฏิกิริยากับสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนแก่ DPPH แล้ว จะเกิดเป็นสารประกอบที่เสถียร ทำให้สีม่วงจางลง โดยปิเปตสารสกัดหยาบกาไหมด้วยวิธีต่างๆ ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร และเติม สารละลาย DPPH ปริมาตร 750 มิลลิลิตร บ่มในที่มืด

30 นาที จากนั้นนำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใช้เอทานอลเป็นหลอดเปรียบเทียบ (Blank) และใช้วิตามินซี (Vitamin C) ที่ความเข้มข้น 0, 2, 4, 6, 8, 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นสารมาตรฐาน²² ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแสดงในค่าความเข้มข้น ไมโครกรัมสมมูลของวิตามินซี (Vitamin C equivalent; VCE) โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน และนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาคำนวณหาค่า % Inhibition และรายงานค่าเปรียบเทียบกับวิตามินซีต่อน้ำหนักของรังไหมแห้ง 1 กรัมในหน่วย (μg VCE/g)

ดังสมการ

$$\% \text{ Inhibition} = [(A_{\text{control}} - A_{\text{sample}}) / A_{\text{control}}] \times 100$$

เมื่อ

A_{control} = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม

A_{sample} = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดลองที่มีกาไหมที่สกัดด้วยวิธีการต่าง ๆ

5.2. วิธี ABTS decolorization scavenging effect

ดัดแปลงจาก Re และคณะ (1999) โดยเตรียมสารละลาย ABTS (2,2-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) โดยเตรียมสารละลายโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ($K_2S_2O_8$) ความเข้มข้น 2.45 มิลลิโมลาร์ ละลายในน้ำกลั่นผสมกับ ABTS ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ ละลาย ในน้ำกลั่นด้วยอัตราส่วน 1:1 เก็บในที่มืด อุณหภูมิห้อง เป็น เวลา 12 ชั่วโมง จะได้สารละลาย ABTS ก่อนนำไปใช้ต้องเจือจางด้วยน้ำกลั่นให้มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร เท่ากับ 0.70 ± 0.02 วิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ โดยเติมสารสกัดหยาบกาไหม 50 ไมโครลิตร ในน้ำกลั่น 200 ไมโครลิตร แล้วเติม ABTS 1500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปบ่มในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร โดยใช้เอทานอล เป็น Blank นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ ไปวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน ของ Vitamin C (0, 4, 8, 12, 16, 20 $\mu g/ml$)²² แสดงในค่าความเข้มข้น ไมโครกรัมสมมูลของ Vitamin C และนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาคำนวณหา

% inhibition ดังสมการ รายงานค่าเปรียบเทียบกับ วิตามินซีต่อน้ำหนักของรังไหมแห้ง 1 กรัมในหน่วย ($\mu\text{g VCE/g}$)

$$\% \text{ Inhibition} = [(A-B)/A] \times 100$$

A คือ ค่าการดูดกลืนแสงเริ่มต้นของ ABTS

B คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดกาวไหมที่ ทำปฏิกิริยากับ ABTS

6. การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

ในการวิเคราะห์ปริมาณ Bioactive compound และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพแต่ละวิธีทดสอบจะทำการ วิเคราะห์โดยการซ้ำ 3 ครั้ง (triplicate) แสดงข้อมูลใน รูปแบบ ค่าเฉลี่ย $\pm$ ค่าเบี่ยงมาตรฐาน (Mean $\pm$ SD, $n = 3$) และวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ one-way ANOVA เพื่อดูความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยอย่างมี นัยสำคัญและใช้ Duncan's multiple range test (DMRT) เพื่อหาความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้ โปรแกรม IBM SPSS (Statistical Package for the

Social Sciences เวอร์ชัน 26) ตั้งค่าความสำคัญทางสถิติ ที่ $P \leq 0.05$

ผลการวิจัย

1. การคำนวณหาร้อยละของการลอกกาวไหม (% Degumming)

เมื่อทำการลอกกาวไหมด้วยวิธีต้มด้วยน้ำกลั่น ต้ม ด้วย 0.2% Na_2CO_3 ต้มด้วยสารละลายซีเฝ้าปริมาณ 30 มิลลิลิตรและสกัดด้วยสารละลาย 8M ยูเรีย ลักษณะทาง กายภาพของสารสกัดในทุกวิธีมีความใกล้เคียงกันมากคือ เป็นสารละลายสีเหลืองอ่อน ได้ร้อยละของการลอกกาว ไหม ดังแสดงใน Table 1. ผลการทดลองพบว่าวิธีการลอก กาวและระยะเวลาที่มีผลต่อร้อยละการลอกกาวอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) โดยวิธีการลอกกาวด้วย Sodium Carbonate ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด และจากการ คำนวณร้อยละของการลอกกาวไหม พบว่ามีร้อยละของ การลอกกาวไหมอยู่ในช่วงระหว่าง 3.96 - 27.95 โดยการ สกัดหยาบด้วย 0.2% Na_2CO_3 ที่เวลา 60 นาที มีร้อยละ ของการลอกกาวไหมมากที่สุดคือ 27.95

Table 1. Degumming efficiency achieved by various extraction techniques.

Extraction methods	Time (min)	% Degumming
Distilled Water	30	6.96 ± 0.24^b
	60	9.37 ± 0.11^c
	90	3.96 ± 0.05^a
0.2% (w/v) Na_2CO_3	30	27.62 ± 0.03^h
	60	27.95 ± 0.04^i
	90	26.24 ± 0.04^g
Ash solution	30	24.10 ± 0.04^d
	60	26.23 ± 0.03^g
	90	25.89 ± 0.03^f
8M Urea		25.55 ± 0.02^e

^{a-i} Data are presented as mean $\pm$ SD ($n=3$). Different lowercase letters indicate a statistically significant difference at the $p \leq 0.05$ level, as determined by one-way ANOVA followed by Duncan's multiple range test (DMRT).

2. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในสารตัวอย่างโดยวิธี Bradford assay

จากการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford assay ปริมาณโปรตีนในสารตัวอย่างกาไหมที่สกัดด้วยวิธีต่าง ๆ แสดงใน Table 2.

ปริมาณโปรตีนของตัวอย่างสารสกัดหยาบกาไหม

อีรีด้วยวิธีต่าง ๆ พบว่าปริมาณโปรตีนทั้งหมดของกาไหม อยู่ระหว่าง 129.796 ± 0.143 - 791.890 ± 0.854 ไมโครกรัมต่อ มิลลิลิตร โดยวิธีการสกัดหยาบด้วย $0.2\% \text{ Na}_2\text{CO}_3$ ที่เวลา 30 นาที ให้ปริมาณของโปรตีนมากที่สุด คือ 791.890 ± 0.854 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักแห้ง ของรังไหม 1 กรัม

Table 2. Protein content in sericin extract from Eri Silk.

Extraction methods	Time (min)	Protein Content (<i>S.ricini</i>) (mg/g)
Distilled Water	30	129.80 ± 0.13^a
	60	233.88 ± 0.56^b
	90	250.58 ± 0.76^c
0.2% (w/v) Na_2CO_3	30	791.89 ± 0.85^i
	60	725.90 ± 0.72^h
	90	615.25 ± 0.37^f
Ash solution	30	225.15 ± 0.57^b
	60	548.89 ± 0.75^e
	90	415.08 ± 0.86^d
8M Urea		692.86 ± 0.49^g

^{a-i} Data are presented as mean $\pm$ SD (n=3). Different lowercase letters indicate a statistically significant difference at the $p \leq 0.05$ level, as determined by one-way ANOVA followed by Duncan's multiple range test (DMRT).

3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณสารฟลาโวนอยด์

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในสารตัวอย่างกาไหมที่สกัดหยาบด้วยวิธีต่าง ๆ แสดงใน Table 3. พบว่า สารสกัดหยาบกาไหมมีสารประกอบฟีนอลิกอยู่ระหว่าง 14.60 ± 2.12 - 253.10 ± 7.07 mg GAE/g โดยวิธีการสกัดหยาบด้วยสารละลายน้ำซึ่ได้เป็นเวลา 90 นาทีให้ ปริมาณ ของสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด คือ 253.10 ± 7.07 mg GAE/g ส่วนการทดสอบหาปริมาณ สารฟลาโวนอยด์ พบว่าสารสกัดหยาบกาไหมมีสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 1.72 ± 1.21 - 71.66 ± 2.78 mg QE/g โดยวิธีการสกัดหยาบด้วยสารละลายยูเรีย ให้

ปริมาณของสารฟลาโวนอยด์มากที่สุดคือ 71.67 ± 2.78 mg QE/g

4. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

4.1. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี

DPPH radical scavenging assay

จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ในสารตัวอย่างกาไหมที่สกัดหยาบด้วยวิธีต่าง ๆ แสดงใน Table 4. พบว่า สารสกัดหยาบมีร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ (% inhibition) อยู่ระหว่าง 11.32 ± 0.18 - 62.07 ± 0.79 % โดยวิธีการสกัดหยาบด้วยวิธีต้มด้วยน้ำกลั่นเป็นเวลา 90 นาทีที่มีความสามารถในการยับยั้งมากที่สุดคือ 62.07 ± 0.79 %

Table 3. Total phenolic content and flavonoid content of silk sericin crude extracts obtained by different extraction methods.

Extraction methods	Time (min)	Total phenolic content (mg GAE/g of dry weight)	Total flavonoid content (mg QE/g of dry weight)
Distilled Water	30	14.60 ± 2.12 ^a	7.14 ± 0.20 ^c
	60	21.10 ± 2.83 ^b	24.64 ± 0.59 ^g
	90	30.10 ± 0.82 ^c	27.93 ± 0.64 ^h
0.2% (w/v) Na ₂ CO ₃	30	208.77 ± 1.16 ^f	2.28 ± 0.48 ^b
	60	213.10 ± 0.00 ^g	1.72 ± 1.21 ^a
	90	247.60 ± 2.12 ⁱ	20.61 ± 0.96 ^f
Ash solution	30	175.60 ± 3.54 ^e	14.59 ± 0.16 ^d
	60	228.60 ± 0.71 ^h	18.67 ± 1.57 ^e
	90	253.10 ± 7.07 ⁱ	41.72 ± 0.00 ⁱ
8 M Urea		99.00 ± 14.14 ^d	71.67 ± 2.78 ^j

^{a-j} Data are presented as mean ± SD (n=3). Different lowercase letters indicate a statistically significant difference at the $p \leq 0.05$ level, as determined by one-way ANOVA followed by Duncan's multiple range test (DMRT).

Table 4. Antioxidant activity of silk sericin crude extracts obtained by different extraction methods using DPPH assay.

Extraction methods	Time (min)	Antioxidant activity (µg VCE/g)	% Inhibition
Distilled Water	30	374.24 ± 7.84	46.82 ± 1.78 ^g
	60	336.52 ± 9.77	42.50 ± 1.80 ^f
	90	492.29 ± 8.63	62.07 ± 0.79 ^h
0.2% (w/v) Na ₂ CO ₃	30	134.57 ± 12.44	17.83 ± 1.88 ^b
	60	140.85 ± 3.58	17.81 ± 0.66 ^b
	90	165.33 ± 3.80	21.21 ± 0.33 ^c
Ash solution	30	166.568 ± 2.44	21.155 ± 0.38 ^c
	60	212.889 ± 5.44	27.539 ± 0.94 ^e
	90	174.275 ± 5.02	22.253 ± 0.64 ^d
8 M Urea		92.87 ± 0.41	11.32 ± 0.18 ^a

^{a-h} Data are presented as mean ± SD (n=3). Different lowercase letters indicate a statistically significant difference at the $p \leq 0.05$ level, as determined by one-way ANOVA followed by Duncan's multiple range test (DMRT).

4.2. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS decolorization scavenging effect

จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี ABTS decolorization scavenging effect ใน ส า ร ตัวอย่างกาบไหมที่สกัดด้วยวิธีต่าง ๆ แสดงใน Table 5 ผลจากการทดสอบ พบว่าสารสกัดกบไหมมีร้อยละ

การยับยั้งอนุมูลอิสระ (%inhibition) อยู่ระหว่าง $2.847 \pm 0.273 - 90.005 \pm 2.815$ โดยวิธีการสกัดด้วยวิธีต้มด้วยน้ำซึ้ได้เป็นเวลา 90 นาทีมีร้อยละของความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระมากที่สุดคือ 90.005 ± 2.815

Table 5. Antioxidant activity of silk sericin crude extracts obtained by different extraction methods using ABTS assay.

Extraction methods	Time (min)	Antioxidant activity ($\mu\text{g VCE/g}$)	% Inhibition
Distilled Water	30	17.68 ± 3.76	3.16 ± 1.27^b
	60	30.38 ± 2.14	3.85 ± 0.29^c
	90	21.68 ± 12.02	2.85 ± 0.27^a
0.2% (w/v) Na_2CO_3	30	817.73 ± 1.08	79.936 ± 2.569^g
	60	895.07 ± 13.28	87.096 ± 1.815^h
	90	901.38 ± 6.50	88.215 ± 0.861^i
Ash solution	30	600.859 ± 7.59	58.90 ± 1.16^f
	60	571.980 ± 8.15	56.94 ± 0.98^e
	90	919.608 ± 2.25	90.01 ± 2.82^j
8 M Urea		163.01 ± 13.94	16.61 ± 1.60^d

^{a-j} Data are presented as mean $\pm$ SD (n=3). Different lowercase letters indicate a statistically significant difference at the $p \leq 0.05$ level, as determined by one-way ANOVA followed by Duncan's multiple range test (DMRT).

อภิปรายผลการวิจัย

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอจากเส้นไหมเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กระบวนการพัฒนา การปลูกหม่อน เลี้ยงไหมก็ยังคงดำเนินต่อไป ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากไหมในประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับไปทั่วโลกถึงคุณภาพและความสวยงามของเส้นไหม โดยประเทศไทยนั้นมีการผลิตถึงประมาณ 600-700 เมตริกซ์ตันต่อปีจัดว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก²³ การนำเส้นไหมไปใช้ประโยชน์นั้นจำเป็นจะต้องมีการลอกกาบไหมที่ยึดเส้น

ใยไฟโบรอินออกเสียก่อน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การใช้สารละลายกรด ต่าง หรือเอนไซม์ โดยทั่วไปนั้นนิยมใช้สารละลายด่างที่อุณหภูมิสูงซึ่งส่งผลให้คุณภาพของเส้นใยที่ได้นั้นไม่สมบูรณ์ จึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาวิธีในการลอกกาบไหมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งนำเอาของเสียจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาวิธีการสกัดโปรตีนกาบไหมออกจากเส้นไหมที่ได้จากไหมป่าอีรี่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในสภาวะรุนแรงโดยการต้มด้วยสารละลายซึ้ได้จากการเผาข้าวหลามด้วยฟืนไม้ไผ่ เปรียบเทียบกับวิธีการสกัดแบบดั้งเดิมอื่นๆที่ใช้

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอคือ การต้มด้วยน้ำกลั่น การต้มด้วย 0.2% (w/v) Na_2CO_3 และการสกัดด้วยสารละลาย 8 M ยูเรีย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของเส้นไหมปาอีรี (*S. ricini*) พบว่ามีข้อได้เปรียบที่เด่นชัดกว่าไหมบ้าน (*B. mori*) ในหลายมิติ เช่น เส้นไหมอีรีมีความยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงดึงในสภาวะต่าง ๆ ได้ดีกว่า เนื่องจากมีค่าการยืดตัวก่อนขาด (Elongation at break) ที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังพบว่าไหมปาอีรียังมีสัดส่วนของกรดอะมิโนที่มีแขนงข้างขนาดใหญ่ (Bulky side chain) เช่น ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) และ ไทโรซีน (Tyrosine) ที่สูงกว่า ซึ่งส่งผลให้การจัดเรียงตัวของโมเลกุลมีความเป็นระเบียบน้อยกว่าไหมบ้าน ทำให้เส้นไหมอีรีมีลักษณะโครงสร้าง รูพรุน (Porosity) และมีขนาดช่องว่างภายในเส้นใยที่มากกว่า ส่งผลให้มีความสามารถในการดูดซับความชื้น (Moisture regain) และการระบายอากาศที่สูงที่สุดในบรรดาไหมเศรษฐกิจทั้งหมด ในด้านสัณฐานวิทยา เส้นไหมอีรีมีพื้นผิวที่ขรุขระและมีความเป็นผลึก (Crystallinity) ที่แตกต่างจากไหมบ้าน โดยมีกรดอะมิโนอลานีนที่มีลำดับต่อเนื่องกัน (Poly-alanine sequences) ยาวกว่า ทำให้มีโครงสร้างกิ่งผลึกที่ช่วยให้เส้นใยมีความเหนียว (Toughness) และความสามารถในการทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า นอกจากนี้ ไหมอีรียังมีปริมาณกรดอะมิโนที่มีขั้ว (Polar amino acids) เช่น กรดแอสพาร์ติกและกรดกลูตามิก (Glutamic acid) กระจายตัวอยู่ในชั้นโปรตีนเซรีซินและไฟโบรอินมากกว่า ทำให้มีคุณสมบัติ การจับยึดเกาะ (Adhesion) กับสารตกแต่งหรือสีย้อมธรรมชาติได้มีประสิทธิภาพกว่า รวมถึงให้สัมผัสที่นุ่มฟูคล้ายขนสัตว์ (Wool-like texture) ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เน้นความสบายและระบายความร้อนได้ดี^{1, 24}

ผลการทดลองพบว่า การลอกกาวยไหมอีรีด้วยการต้มกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ที่เวลา 30 60 และ 90 นาที มีร้อยละการลอกกาวยไหมไม่แตกต่างกันมาก เมื่อเทียบผลกับการสกัดหยาบด้วยสารละลายยูเรีย การต้มด้วยน้ำกลั่น และต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 โดยพบว่า มีร้อยละการลอก

กาวยไหมมากกว่าสารสกัดที่ต้มด้วยน้ำกลั่น แต่มีร้อยละการลอกกาวยไหมน้อยกว่าการสกัดที่ต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 เล็กน้อยและใกล้เคียงกับการลอกกาวยไหมด้วยสารละลายยูเรีย (Table 1.) โดยที่การลอกกาวยไหมอีรีด้วยวิธีการต้มด้วยน้ำกลั่น ต้มด้วยน้ำโซเดียมคาร์บอเนตและต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 ที่เวลา 60 นาทีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีร้อยละของการลอกกาวยไหมสูงกว่าการสกัดที่เวลา 30 และ 90 นาที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยโดย Chattopadhyay และคณะ (2016)²⁵ ที่ทำการลอกกาวยไหมอีรีโดยใช้สารละลาย Na_2CO_3 และสารละลายสบู่ที่มีความเข้มข้นต่างกัน 2 ระดับ (10% และ 20% w/v) ควบคู่กับการต้มที่ระยะเวลาแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าการใช้โซเดียมคาร์บอเนตและสบู่ที่มีความเข้มข้นประมาณ 10% ร่วมกับการต้มนาน 60 นาทีจะช่วยให้ลอกกาวยไหมอีรีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นใยไหม นอกจากนี้การใช้สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตที่มีความเข้มข้น 20% w/v จะส่งผลให้เส้นใยไหมฉีกขาดอีกด้วย²⁵ นอกจากนี้ยังได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเทคนิคการลอกกาวยไหมจากไหมอีรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมีใด ๆ โดยเรียกกระบวนการนี้เรียกว่า "Eco-Eri" ซึ่งได้ทำการลอกกาวยไหมโดยใช้น้ำอ่อน หรือ soft water ซึ่งคือน้ำที่ได้เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการกรองเอาความกระด้างที่ผสมหรือเจือปนกับน้ำเช่น แคลเซียม แมกนีเซียมออกไปจนหมด และน้ำกระด้าง (hard water) เป็นตัวทำละลายในการสกัดโดยใช้อุณหภูมิที่ 110 120 130 และ 140 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 20 และ 30 นาที แล้วทำการเปรียบเทียบการสกัดแบบ Eco-Eri กับวิธีการสกัดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือใช้โซดาผสมกับสบู่และวิธีการลอกกาวยไหมเอนไซม์โปรตีนเอส รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสัณฐานพื้นผิวเส้นใยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope; SEM) และทดสอบคุณสมบัติของเส้นใย เช่น แรงดึงและความยืดหยุ่น ผลการทดลองพบว่า วิธี Eco-Eri ที่ใช้อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที กับน้ำอ่อน สามารถ

ลอกกาวยุคใหม่ได้ดีที่สุด (15.7% degumming) อีกทั้งเส้นใยใหม่อีกรุ่นที่มีความนุ่มนวลสม่ำเสมอ สลัดฐานพื้นผิวของเส้นใยมีผิวเรียบที่สุด ส่วนการลอกกาวยุคใหม่ด้วยโซดาผสมกับสบู่และการใช้เอนไซม์นั้นมีประสิทธิภาพในการลอกกาวยุคใหม่อยู่ที่ 14.5% และ 12% ตามลำดับ นอกจากนี้ การใช้วิธีลอกกาวยุคใหม่แบบ Eco-Eri ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และโซดาผสมกับสบู่ยังทำให้เกิดความเสียหายและแตกแยกของเส้นใยใหม่อีกด้วย²⁶ ซึ่งในงานวิจัยนี้สารละลายน้ำต่างที่ใช้ในการลอกกาวยุคใหม่ เตรียมโดยใช้ขี้เถ้าที่ได้จากการเผาข้าวหลามด้วยฟืนไม้ไผ่ ซึ่งเป็นขี้เถ้าที่มีความสะอาดสูง เนื่องจากกระบวนการเผาข้าวหลามเป็นการเผาไหม้ในที่จำกัดและใช้ไม้ไผ่เป็นเชื้อเพลิงหลัก มีเขม่าควันหรือสารแขวนลอยต่ำเมื่อเทียบกับขี้เถ้าจากการเผาขยะ อีกทั้งไม้ไผ่เป็นพืชที่มีปริมาณ โพแทสเซียมสูงเมื่อนำมาทำน้ำต่างจะได้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่างแก่ที่นุ่มนวลกว่าโซดาไฟ เหมาะสำหรับการใช้ในการลอกกาวยุคใหม่โดยไม่ทำลายเส้นใยธรรมชาติ สารละลายน้ำต่างที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้มีค่า pH = 10.2 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสม (pH = 10-11) ที่ทำให้สามารถกำจัดไขมันและสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายโครงสร้างโปรตีนของเส้นใย และใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าในการสกัดคือ 100 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณสมบัติของเส้นใยใหม่ให้สมบูรณ์ที่สุด และมีประสิทธิภาพในการลอกกาวยุคใหม่ได้ดีกว่าอีกด้วย นอกจากนี้ในขี้เถ้าไม้ไผ่และเยื่อไผ่ยังมีปริมาณซิลิกา (Silica) อยู่สูงโดยที่ซิลิกาในขี้เถ้ามีลักษณะเป็นอนุภาคละเอียดที่มีรูพรุนสูง ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารขัดผิวระดับไมโครช่วยเสริมแรงในการกำจัดโปรตีนเซรีซินออกจากเส้นใยไฟโบรอิน²⁷ อีกทั้งซิลิกาที่ตกค้างในระดับโมเลกุลจะช่วยปรับปรุงพื้นผิวเส้นใยให้มีความขรุขระเล็กน้อย (Surface roughness) ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในขั้นตอนการย้อมผ้า ช่วยให้สีย้อมธรรมชาติติดเกาะกับเส้นใยได้ดีขึ้นอีกด้วย จะเห็นได้ว่ากระบวนการลอกกาวยุคใหม่นั้น วิธีการสกัดจะส่งผลต่อคุณสมบัติทางชีวเคมีของโปรตีนในเส้นใยใหม่อย่างมาก มีงานวิจัยที่ศึกษากระบวนการสกัดเซรีซินจากไหมหลายสายพันธุ์โดยใช้

สารละลายกรด สารละลายด่างและน้ำร้อน พบว่าสายพันธุ์ไหมที่แตกต่างกันจะมีแบบแผนโปรตีนที่แตกต่างกันและจะส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพและหน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน^{28, 29}

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของโปรตีนจากสารสกัดหยาบของกาวยุคใหม่อีกรุ่นด้วยวิธี Bradford assay การสกัดหยาบที่ต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 เป็นเวลา 30 นาที มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด (Table 2.) หากเทียบกับการสกัดหยาบที่ต้มด้วยน้ำกลั่นและต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 การต้มด้วยสารละลายขี้เถ้ามีปริมาณโปรตีนมากกว่าการสกัดที่ต้มด้วยน้ำกลั่นและมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าการสกัดที่ต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 และได้ปริมาณโปรตีนน้อยกว่าการสกัดด้วยสารละลายยูเรีย เมื่อคิดเป็นปริมาณต่อน้ำหนักแห้งของรังไหม 1 กรัม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ทำการลอกกาวยุคใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ พบว่าการลอกกาวยุคใหม่โดยใช้สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตและยูเรียจะได้ปริมาณโปรตีนสูงกว่าการใช้ น้ำกลั่นในการสกัด^{30, 31} นอกจากนี้การสกัดหยาบด้วย 0.2% Na_2CO_3 พบว่าปริมาณโปรตีนมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาในการต้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสภาวะความเป็นด่างของโซเดียมคาร์บอเนตร่วมกับความร้อนที่ยาวนาน ส่งผลให้เกิด การสลายตัวของโปรตีนกาวยุคใหม่ (Alkaline hydrolysis) อย่างรุนแรง ทำให้สายพอลิเมอร์ของโปรตีนถูกย่อยเป็นเปปไทด์ขนาดเล็กหรือกรดอะมิโนอิสระ ซึ่งมีขนาดต่ำกว่าขีดจำกัดในการตรวจวัดของวิธี Bradford assay (< 3 KDa) ส่งผลให้ปริมาณโปรตีนที่ตรวจพบมีค่าลดลงเมื่อใช้เวลาในการลอกกาวยุคใหม่นานเกินไป³²

ผลจากการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกด้วยวิธี Folin - Ciocalteu ของสารสกัดหยาบกาวยุคใหม่อีกรุ่นซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการถ่ายเทอิเล็กตรอนของสารสกัดหยาบโดยวัดปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและ reducing substance จากการเปลี่ยนจากสีเหลืองเข้มไปเป็นสีเขียวน้ำเงิน พบว่า สารสกัดหยาบที่ได้จากการต้มด้วยสารละลายขี้เถ้าที่เวลา 90 นาทีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่าเวลาช่วงอื่น และเมื่อ

เทียบกับสารสกัดหยาบที่ต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 ที่เวลา 90 นาทีจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างกันมาก เมื่อเทียบกับวิธีการสกัดหยาบด้วย 8 M Urea พบว่าวิธีการสกัดหยาบด้วยสารละลายยูเรียให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกน้อยกว่าการต้มด้วยสารละลายซี้เถ้าและต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 (Table 3.) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในปี ค.ศ. 2017 ที่ตรวจวัดปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกในสารสกัดกาวไหมจากไหม 3 สายพันธุ์ซึ่งพบว่าเมื่อสกัดด้วยสารละลายยูเรียจะให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกน้อยกว่าการต้มด้วยสารละลายต่าง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก Polyphenols นั้นหลายชนิดมักจะจับอยู่ (Conjugated) กับโครงสร้างของโปรตีนในเส้นไหม การใช้พลังงานสูงที่เกิดจากการให้ความร้อนเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะไปทำลายพันธะโควาเลนต์และ Non-covalent ระหว่างโปรตีนไฟโบรอินในเส้นไหมทำให้สารสกัดกาวไหมที่ได้นั้นมีปริมาณ Polyphenols สูงด้วย²

จากการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี Aluminium chloride colorimetric assay ของสารสกัดหยาบกาวไหมฮิรี พบว่า สารสกัดหยาบที่ได้จากการต้มด้วยสารละลายซี้เถ้าที่เวลา 90 นาทีที่มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์มากกว่าเวลาช่วงอื่น และมีปริมาณสารฟลาโวนอยด์มากกว่าสารสกัดหยาบที่ต้มด้วยน้ำกลั่น ส่วนการต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์น้อยที่สุด (Table 3.) และวิธีการสกัดหยาบด้วย 8 M Urea ให้ปริมาณสารฟลาโวนอยด์มากกว่าการลอกกาวไหมด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งสารฟลาโวนอยด์หลายชนิดจะจับกับกาวไหมซึ่งเป็นไกลโคโปรตีนด้วยพันธะไกลโคซิดิก ยูเรียจะทำหน้าที่เป็น Chaotropic agent ที่ทำให้โครงสร้างไกลโคโปรตีนของกาวไหมเสียสภาพธรรมชาติ และภายใต้อุณหภูมิที่สูงจนสามารถทำลายพันธะไกลโคซิดิกได้โดยโดยตรงทำให้ฟลาโวนอยด์ในชั้นของกาวไหมซึ่งมักอยู่ในรูปของ Glycosides ที่ละลายน้ำได้ดีถูกปลดปล่อยออกมาได้ดีขึ้น ดังนั้นภายใต้สภาวะการสกัดที่เกิดการทำลายพันธะไกลโคซิดิกได้ดีจะส่งผลให้ได้ปริมาณฟลาโวนอยด์ที่สูง^{2, 12} อีกทั้งในงานวิจัยนี้ ใช้สารละลาย Na_2CO_3 เข้มข้น

เพียง 0.2% เพื่อรักษาสสมบัติทางกายภาพของเส้นไหม ต่างจากในอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งจะใช้ในความเข้มข้นที่สูง (10%-20% w/v) จึงส่งผลให้ได้สารฟลาโวนอยด์ออกมาในปริมาณน้อย และมีรายงานว่าการใช้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น กรดซิตริกซึ่งจะทำลายพันธะไกลโคซิดิกได้ดีในการลอกกาวไหมจะส่งผลให้ได้ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ออกมามากกว่าการใช้สารละลาย Na_2CO_3 ³³ ส่วนการสกัดโดยใช้หม้อนึ่งความดันภายใต้แรงดันสูงเป็นเวลา 60 นาทีอาจทำให้เกิดมีการสลายพันธะไกลโคซิดิกออกมาทำให้สารฟลาโวนอยด์ออกมาในปริมาณที่สูงขึ้น^{2, 34} ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากงานวิจัยนี้

มีรายงานถึงฤทธิ์ทางชีวภาพอันหลากหลายของโปรตีนกาวไหม รวมถึงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลมาจากการทำงานของสาร Polyphenols และฟลาโวนอยด์ที่พบอยู่ในสารสกัดจากกาวไหมแล้วนั้น ในโครงสร้างของกาวไหมที่มีกรดอะมิโนในกลุ่ม Hydrophilic amino acids เป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 76 % ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน โดยมีรายงานว่า กรดอะมิโน Serine, Aspartic acid และ Threonine ที่พบมากในกาวไหมทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระโดย หมู่ -OH ของ Serine และ Threonine สามารถไปจับกับธาตุต่าง ๆ เช่น เหล็กหรือทองแดงได้ ส่วนกรดอะมิโนที่มีวงแหวนอะโรมาติกเป็นองค์ประกอบทำหน้าที่เป็น Electron donors เมื่อทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระต่าง ๆ^{1, 3} ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ในสารสกัดหยาบกาวไหมฮิรี ซึ่ง DPPH เป็นอนุมูลอิสระที่มีความเสถียรที่มีสีม่วงหากสารสกัดหยาบกาวไหมมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสีม่วงจะจางลง พบว่าการสกัดหยาบที่ต้มด้วยน้ำกลั่นที่ 90 นาทีมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสารสกัดหยาบที่ได้จากการต้มด้วยสารละลายซี้เถ้าและต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 โดยมีค่า Antioxidant activity เท่ากับ $492.29 \pm 8.63 \mu\text{g VCE/g}$ และ % inhibition สูงสุดเท่ากับ 62.07 ± 0.79 (Table 4.)

ถึงแม้ว่าการลอกกาวยใหม่ด้วยการต้มด้วยน้ำกลั่นจะได้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ที่ต่ำกว่าการสกัดด้วยวิธีอื่น แต่การให้ความร้อนเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดกระบวนการ Protein Hydrolysis ขึ้น ส่งผลให้โปรตีนในรังไหมแตกตัวเป็น เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive peptide) ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสารประกอบฟีนอลิกหรือฟลาโวนอยด์หลายชนิด นอกจากนี้กรดอะมิโนบางชนิดที่เป็นองค์ประกอบในรังไหมอิตาลี เช่น Tyrosine หรือ Tryptophan มีคุณสมบัติในการให้ไฮโดรเจน (Hydrogen donor) เพื่อหยุดปฏิกิริยาของ DPPH ได้ดีมากอีกด้วย^{35, 36}

สารสกัดกาวยใหม่ที่ได้จากการใช้ต่างและความร้อนจะมีสีเหลืองเข้มกว่าการต้มด้วยน้ำกลั่น เนื่องจากสภาวะต่างไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) หรือปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลกับอะมิโน (Sugar-amine reaction) ระหว่างส่วนประกอบที่เป็นโพลิแซ็กคาไรด์และกรดอะมิโนในโมเลกุลไกลโคโปรตีนของกาวยใหม่ ส่งผลให้เกิดสารประกอบสีน้ำตาลจำพวกเมลานอยดิน (Melanoidin-like compounds) ขึ้นในสารสกัด³⁴

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS decolorization scavenging effect เป็นการนำสารละลาย ABTS มาทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟตเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชันปลดปล่อย $ABTS^{\cdot+}$ ที่มีสีน้ำเงินเข้ม เมื่อทำปฏิกิริยากับสารต้านออกซิเดชันสีจะจางลง พบว่า การสกัดยาวยใหม่ที่ต้มด้วยสารละลายซีเล้าที่ 90 นาทีมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงกว่าสารสกัดยาวยใหม่ที่ต้มด้วยน้ำกลั่นและมีค่าใกล้เคียงกับสารสกัดยาวยใหม่ที่ต้มด้วย 0.2% Na_2CO_3 โดยมีค่า Antioxidant activity เท่ากับ $919.608 \pm 2.25 \mu g$ VCE/g และ %inhibition สูงสุดเท่ากับ 90.01

สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองลอกกาวยใหม่ด้วยวิธีต้มด้วยสารละลายซีเล้าจากการเผาข้าวหลาม เปรียบเทียบกับวิธีต้มด้วยน้ำกลั่น การต้มด้วยสารละลายซีเล้ามีความเข้มข้น 0.2% w/v และการสกัดด้วยสารละลายยูเรีย

แล้วหาปริมาณโปรตีนของสารสกัดยาวยใหม่ป้าอิตาลีด้วยวิธี Bradford assay วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ เปรียบเทียบความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกาวยใหม่ด้วยวิธี DPPH และ ABTS พบว่าการใช้สารละลายซีเล้ามาลอกกาวยใหม่นั้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสารละลายซีเล้าเดียวคาร์บอนเนต อีกทั้งยังมีสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ในปริมาณที่สูง ส่งผลให้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีในวิธี ABTS แต่กำจัดอนุมูลอิสระได้น้อยกว่าการสกัดด้วยการต้มด้วยน้ำกลั่นเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสารที่อยู่ในสารละลายซีเล้า ดังนั้น วิธีการสกัดด้วยสารละลายซีเล้าจากการเผาข้าวหลามด้วยฟืนไม้ไผ่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำไปสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกาวยใหม่อิตาลีและเป็นการนำของเสียจากการผลิตข้าวหลามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ส่วนงานวิจัยในอนาคตอาจมุ่งเน้นไปที่การศึกษาโครงสร้างทางโมเลกุลและแบบแผนของโปรตีนกาวยใหม่ที่สกัดด้วยน้ำต่างธรรมชาติ เพื่อยืนยันว่าโครงสร้างและกรดอะมิโนสำคัญยังคงสภาพสมบูรณ์และมีขนาดโมเลกุลที่เหมาะสมต่อการซึมเข้าสู่ผิว โดยต้องทำการวิจัยควบคู่ไปกับการทดสอบความปลอดภัยในระดับเซลล์ (Cytotoxicity) กับเซลล์ผิวหนังมนุษย์ และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ เช่น การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และการยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายผิว เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือรองรับความเป็นสารสกัดที่ปลอดภัยและมีศักยภาพในการนำไปเป็นส่วนประกอบของเวชสำอาง นอกจากนี้ ควรต่อยอดไปสู่การพัฒนาสูตรตำรับเวชสำอางที่ใช้ระบบนำส่งสารสำคัญ (Nano-delivery systems) เพื่อเพิ่มความคงตัวและประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเป็นต้น รวมถึงเปรียบเทียบความแตกต่างด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างวิธีดั้งเดิมกับวิธี Green Extraction นี้ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและจุดขายที่ชัดเจนในเชิงพาณิชย์ในฐานะนวัตกรรมความงามที่ยั่งยืน (Sustainable Beauty)

เอกสารอ้างอิง

1. Chooluck S, Laoharenu R, Chooluck S. Biological activity of silk sericin protein and its application. *Journal of Science and Technology Mahasarakham University* 2025;44:544-58.
2. Kumar JP, Mandal BB. Antioxidant potential of mulberry and non-mulberry silk sericin and its implications in biomedicine. *Free Radic Biol Med* 2017;108:803-18.
3. Saad M, El-Samad LM, Gomaa RA, Augustyniak M, Hassan MA. A comprehensive review of recent advances in silk sericin: Extraction approaches, structure, biochemical characterization, and biomedical applications. *Int J Biol Macromol* 2023;250:126067.
4. Ghosh S, Gupta S, Kapusetti G, Kundu SC. Silk-based biomaterial scaffolds for dental tissue regeneration. *Commun Mater* 2026;7:63.
5. Kato N, Sato S, Yamanaka A, Yamada H, Fuwa N, Nomura M. Silk protein, sericin, inhibits lipid peroxidation and tyrosinase activity. *Biosci Biotechnol Biochem* 1998;62:145-7.
6. Padamwar M, Pawar A. Silk sericin and its applications: A review. *J Sci Ind Res (India)* 2004;63:323-9.
7. Cho KY, Moon JY, Lee YW, Lee KG, Yeo JH, Kweon HY, et al. Preparation of self-assembled silk sericin nanoparticles. *Int J Biol Macromol* 2003;32:36-42.
8. Kunz RI, Brancalhão RM, Ribeiro LF, Natali MR. Silkworm Sericin: Properties and Biomedical Applications. *Biomed Res Int* 2016;2016:8175701.
9. Mondal M, Trivedy K, Kumar N. The silk proteins, sericin and fibroin in silkworm, *Bombyx mori* Linn. - A review. *Caspian J Env Sci* 2007;5:63-76.
10. Ye J, Xie B, Hu J, Xu X, Lu S, Wang J, et al. Recent advances in silk fibroin-based biomaterials for tissue engineering applications. *Int J Biol Macromol* 2025;322:146764.
11. Wu J-H, Wang Z, Xu S-Y. Preparation and characterization of sericin powder extracted from silk industry wastewater. *Food Chem* 2007;103:1255-62.
12. Aramwit P, Damrongsakkul S, Kanokpanont S, Srichana T. Properties and antityrosinase activity of sericin from various extraction methods. *Biotechnol Appl Biochem* 2010;55:91-8.
13. Aramwit P, Siritientong T, Srichana T. Potential applications of silk sericin, a natural protein from textile industry by-products. *Waste Manag Res* 2012;30:217-24.
14. Hu D, Li T, Liang Wa, Wang Y, Feng M, Sun J. Silk sericin as building blocks of bioactive materials for advanced therapeutics. *J Control Release* 2023;353:303-16.
15. Prakash M, Mathikere Naganna C, Radhakrishnan V, Somayaji P, Sabu L. Therapeutic potential of silkworm sericin in wound healing applications. *Wound Repair Regen* 2024;32:916-40.
16. Liu J, Shi L, Deng Y, Zou M, Cai B, Song Y, et al. Silk sericin-based materials for biomedical applications. *Biomaterials* 2022;287:121638.
17. Hobanthad T. Extraction of sericin from Thai native silk (Nangsew) yarn using mulberry (cv.Buriram 60) leaves extracts as a greener solvent. *SNRU Journal of Science and Technology* 2018;10:156-64.
18. Chooluck S, Jankangram W. Extraction and Biological Activity of Silk Sericin from Thai Native Silk (*Bombyx mori* L.) with Macerated Banana Leaves Solution. *KKU Science Journal* 2022;50:198-211.

19. Wang Y, Gao J, Yang Y, Zhu L, Yang W, Li P, et al. A Review on the Extraction Methods, Bioactivities, and Application in Foods of Silk Sericin. *J Food Biochem* 2025;2025:2155701.
20. Zhao Z-L, Zhang Y-Q. Greener degumming production of layered sericin peptides from a silkworm cocoon and their physicochemical characteristics and bioactivities in vitro. *J Clean Prod* 2020;261:121080.
21. Yun H, Oh H, Kim MK, Kwak HW, Lee JY, Um IC, et al. Extraction conditions of *Antheraea mylitta* sericin with high yields and minimum molecular weight degradation. *Int J Biol Macromol* 2013;52:59-65.
22. Rujakom A, Chusuwan S, Nualnat P, Chooluck S. Extraction and Antioxidant Activity of Bioactive Compounds from Marine Microalgae *Tetraselmis gracilis* BIMS-PP017. *KKU Science Journal* 2024;52:219-34.
23. Ukav I. Mulberry Production Economy in District of Adiyaman. *Asian J Agric Ext Econ Sociol* 2018;23:1-10.
24. Chartvivatpornchai N, Okahisa Y. Structural and mechanical comparison of Eri and Mulberry silk fibroin nanofibers films through advanced mechanical treatments for sustainable applications. *Int J Biol Macromol* 2025;295:139554.
25. Chattopadhyay D, Chakraborty A, Chatterjee S. Studies on degumming of eri silk cocoons. *J Text Inst* 2016;108:1-13.
26. Sreenivasa T, Padaki N. Development of Eco-Friendly Method for Degumming of Eri Cocoons. *Textile Leather Rev* 2023;6:742-59.
27. Azman S, Ameram N, Jaafar H, Mohamad Amini MH, Ali A. Extraction of Silica from Bamboo Leaves Ash (Bambusoideae) Using Hydrochloric Acid and Nitric Acid. *Orbital Electron J Chem* 2023;142-7.
28. Anand P, Pandey JP, Pandey DM. Study on cocoonase, sericin, and degumming of silk cocoon: computational and experimental. *J Genet Eng Biotechnol* 2021;19:32.
29. Sahu N, Pal S, Sapru S, Kundu J, Talukdar S, Singh N, et al. Non-Mulberry and Mulberry Silk Protein Sericins as Potential Media Supplement for Animal Cell Culture. *Biomed Res Int* 2016;2016.
30. Gupta D, Agrawal A, Rangi A. Extraction and characterization of silk sericin. *Indian J Fibre Text Res* 2014;39:364-72.
31. Miguel M GA, Álvarez C. Extraction and antioxidant activity of sericin, a protein from silk. *Braz J Food Technol* 2020;23:e2019058.
32. Giles H, Gallagher J, Warren-Walker D, Bull SP, Lignou S, Methven L, et al. An investigative study into the suitability of the Bradford assay for rapid protein determination in whey. *Food Chem* 2026;499:147375.
33. Zhu L, Lin J, Pei L, Luo Y, Li D, Huang Z. Recent Advances in Environmentally Friendly and Green Degumming Processes of Silk for Textile and Non-Textile Applications. *Polymers (Basel)* 2022;14:659.
34. Kurioka A, Kurioka F, Yamazaki M. Characterization of sericin powder prepared from citric acid-degraded sericin polypeptides of the silkworm, *Bombyx Mori*. *Biosci Biotechnol Biochem* 2004;68:774-80.



35. Kanyora MG, Kegode TM, Kurgat J, Kibogo H, Asudi G, Tanga CM, et al. Evaluating antibacterial and antioxidant properties of sericin recovered from cocoons of *Bombyx mori*, *Gonometa postica* and *Samia ricini* in Kenya. PLOS ONE 2025;19:e0316259.
36. Wongsrangsap N, Chukiatsiri S. Purification and Identification of Novel Antioxidant Peptides from Enzymatically Hydrolysed *Samia ricini* Pupae. Molecules 2021;26.